



آپیرابان®

آپیکسابان ۲،۵ و ۵ میلی گرم

ابوریحان
شرکت داروسازی
تهران - ایران

دفترچه راهنمای عمومی مصرف آپیرابان*

آپیرابان چیست؟

آپیرابان® جدیدترین نسل از دسته داروهای ضد انعقاد خوراکی می باشد که جهت پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی، جلوگیری از بروز سگته قلبی و مغزی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر درجه ای، درمان و کاهش ریسک عود مجدد ترومبوز عروق انتهایی (DVT) و آمبولی ریوی (PE) استفاده می شود.



چگونه باید از آپیرابان استفاده نمود؟

دارو را باید دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید. بدون تجویز پزشک دوز دارو را تغییر ندهید یا دارو را قطع نکنید. دوز دارو در بیماری های مختلف بنا به تشخیص پزشک متفاوت است ولی دوز معمول دارو، ۵ میلی گرم دو بار در روز می باشد. در صورت سن بالای ۸۰ سال، وزن کمتر از ۶۰ کیلوگرم و یا کراتینین سرم بیشتر از ۱/۵ mg/dL، دوز دارو به ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز کاهش می یابد. اگر یک دوز مصرفی را فراموش کردید، دوز فراموش شده را هرچه سریعتر مصرف کنید، هرگز دوز داروی خود را دو برابر نکنید.

مزیت های آپیرابان® نسبت به سایر داروهای ضد انعقاد چیست؟

آپیرابان® یک داروی ضد انعقاد جدید است که مزایای مهمی نسبت به سایر داروهای ضد انعقاد دارد. این مزایا باعث شده است که مصرف این دارو در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش باشد و در بسیاری از بیماران جایگزین داروهای پیشین شده است.

برخی از این مزایا عبارتند از:

- عدم نیاز به پایش فاکتورهای انعقادی خون
- تداخلات دارویی بسیار ناچیز
- جذب خوراکی سریع و بدون تداخل با غذا
- کاهش ریسک خونریزی های شدید
- انتخاب اول در بیماران کلیوی



ویژگی های آپیرابان®

با توجه به تداخل کمتر آپیرابان® با غذا و داروهای دیگر، نیازی به انجام مکرر تست های کنترلی روتین مانند PT، PTT و INR نمی باشد.

همچنین به دلیل نوع ساختار شیمیایی آپیرابان®، نسبت به داروهای ضد انعقاد پیشین (مانند ريواروکسابان) ریسک بروز عارضه جانی و خونریزی های شدید، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

شایان ذکر است به دلیل مکانیسم دفع آپیرابان® از بدن که به میزان کمتری از طریق کلیه دفع می گردد، انتخاب اول متخصصین برای بیماران مبتلا به نارسایی های کلیوی می باشد.

موارد منع مصرف آپیرابان®

آپیرابان® در بیماران با خونریزی فعال و دارای حساسیت و واکنش های آلرژیک نسبت به دارو، منع مصرف دارد.

مصرف آپیرابان® در دوران بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید، به پزشک خود اطلاع دهید. اثر این دارو روی جنین شناخته شده نیست.

همچنین اگر در دوران شیردهی هستید با پزشک خود مشورت کنید. ترشح این دارو در شیر مادر ناشناخته است.



توصیه های عمومی در حین مصرف آپیرابان®

- قبل از هرگونه اقدام دندانپزشکی یا جراحی، پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید. ممکن است قبل از اینکه جراحی را انجام دهید، لازم باشد برای مدت کوتاهی مصرف آپیرابان® را قطع کنید.
- در طول مصرف این دارو، احتمال بروز کبودی و خونریزی بیشتر می شود و در صورت بروز خونریزی، زمان بیشتری طول می کشد تا خونریزی قطع گردد.
- قبل از مصرف هر گونه داروی بدون نسخه و یا با نسخه مانند آسپرین و داروهای مسکن (داروهایی که در خونریزی اثر دارند) پزشک خود را مطلع نمایید.
- مصرف دارو را بدون مشورت کردن با پزشک خود، قطع نکنید. قطع ناگهانی می تواند خطر لخته شدن خون یا سکته را افزایش دهد.



Making the right choice!



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

APIRABAN®

Apixaban 2.5 & 5 mg

Aburaihan
Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran



تداخلات دارویی احتمالی

در صورت مصرف داروهای ذیل که خطر ابتلا به خونریزی را افزایش می دهند به پزشک خود اطلاع دهید:

آسپرین، وارفارین، مصرف طولانی مدت داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (مانند ایبوپروفن)، هپارین، مهارکننده های بازجذب سروتونین و یا نوراپی نفرین (مانند فلوکستین، سرتالین و...) داروهای زیر اثر آپیرابان را کم می کنند: ریفامپین، کاربامازپین، فنی توئین داروهای زیر اثر آپیرابان را افزایش می دهند: کتوکونازول، ایتراکونازول، کلاریترومایسین، ریتوناویر در صورت مصرف همزمان با داروهای کاهنده یا افزایشده اثر آپیرابان با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی خود، ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. برخی عوارض جانبی آپیرابان عبارتند از:

کبودی پوست، خونریزی غیر معمول (بینی، دهان، واژن، رکتوم)، خونریزی از زخم یا محل تزریق، دوره های قاعدگی سنگین، احساس سردرد، سرگیجه و ضعف، مدفوع سیاه یا خونی، سرفه کردن همراه با خون و یا استفراغ خونی، بی حسی و یا سوزن سوزن شدن و یا ضعف عضلانی (به خصوص در پاها) آپیرابان ممکن است باعث بروز خارش پوستی یا واکنش شدید آلرژیک شود. اگر یکی از علائم زیر را داشتید، با پزشک خود تماس بگیرید: درد قفسه سینه یا تنگی نفس، تورم صورت یا زبان، مشکل تنفس یا خفگی، احساس سرگیجه یا ضعف.

شرایط نگهداری

آپیرابان را در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



ریسک فاکتورهای ترومبوز:

لخته ها با تشکیل در عروق بزرگ بدن مثل پا و ریه در صورت عدم درمان به موقع، منجر به مشکلات تهدیدکننده حیات می شوند.

ریسک های بالا برای ایجاد این نوع ترومبوز عبارتند از:

- تروما، جراحی، بستری بودن در بیمارستان به مدت طولانی
- بارداری
- سن بالا
- اضافه وزن و چاقی
- سابقه فامیلی ابتلا به لخته
- سرطان
- بیماری های التهابی روده
- استفاده از قرص های ضد بارداری
- پرواز یا رانندگی طولانی مدت
- افراد مبتلا به بیماری های خودایمنی مثل لوپوس
- سیگار کشیدن
- نارسایی قلب



۰۲۱۷۷۷۱۵۵۵۴



www.aburaihan.com

www.apiraban.com



Aburaihanpharma

مصرف کننده محترم از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم.

شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.



Aburaihan
Pharmaceutical Co.