

# دینوول ۲ میلی گرم

## دینوژست

### دسته دارویی:

پروژسترون سیتتیک، آنتی آندروژن

### موارد مصرف:

درمان اندومتریوزیس (علائم دردناک به علت حضور نابه جای بافت پوشاننده ی داخل رحم در نقاط مختلف)

### مکانیسم عمل:

دینوژست با کاهش تولید استرادیول و اثرات تروفیک آن بر روی بافت یوتوپیک و اکتوپیک اندومتریوز عمل می کند.

### میزان و نحوه ی مصرف:

دستور مصرف دارو توسط پزشک یا داروساز مشخص می گردد. اما به طور معمول دینوژست می تواند در هر روز از سیکل قاعدگی شروع شود.

بزرگسالان: روزی یک قرص ترجیحاً در زمان معینی مصرف شود. با اتمام بسته، بسته بعدی بدون فاصله شروع می شود. طول درمان با دینوژست در بیماران دارای اندومتریوز بیش از ۱۵ ماه گزارش نشده است.

در صورت فراموش شدن دارو و استفراغ یا اسهال، دینوژست اثرگذاری کمترین خواهد داشت. در صورت فراموش کردن یک عدد یا تعداد بیشتری قرص ها، هر چه سریعتر یک قرص را مصرف نموده و بقیه بسته را طبق روال گذشته مصرف نمایید. در صورت اسهال شدید یا استفراغ ۳ تا ۴ ساعت بعد از مصرف دینوژست، دوز را دوباره تکرار نمایید.

### موارد منع مصرف:

دینوژست نباید در شرایط زیر مصرف شود.

. بارداری یا وجود بارداری مشکوک

. شیردهی

. ترومبوآمبولی فعال

. بیماریهای قلبی عروقی

. دیابت ملیتوس با درگیری عروقی

. تومورهای کبدی خوش خیم یا بدخیم

. وجود سرطان های وابسته به هورمون های جنسی

. خونریزی واژینال با علت نامشخص

. واکنش های حساسیتی به دینوژست

### موارد هشدار و احتیاط:

هنگام مصرف دینوژست از استفاده همزمان ضد بارداری هورمونی از هر نوع خودداری شود. دینوژست یک داروی ضد بارداری نیست و در صورت نیاز به جلوگیری از بارداری باید از روش های دیگر غیر هورمونی مانند کاندوم استفاده شود. در صورت وجود شرایط زیر پزشک خود را مطلع سازید :

. سابقه ی ترومبوآمبولی وریدی یا بروز آن در خانواده ی درجه یک

. سابقه ی افسردگی

. سابقه ی سرطان سینه در افراد درجه یک خانواده

. سابقه ی فشار خون بالا یا افزایش فشار خون با مصرف دینوژست

. بوجود آمدن بیماری کبدی با مصرف دینوژست

. بروز کلاسم (لکه های قهوه ای بر روی پوست)

. درد زیر شکم

### بارداری و شیر دهی:

در صورت بارداری و شیردهی دارو را مصرف ننمایید.

تداخلات دارویی / غذایی :

دینوژست می تواند با داروهای زیر تداخل داشته باشد :

. فنی توین

. باربیتورات ها

. پریمیدون

. کاربامازپین

. کتوکونازول

. ایتراکونازول

. اریترومايسين

. ریتوناویر

. زمان مصرف دینوژست از مصرف گریپ فروت بپرهیزید زیرا این تداخل می تواند باعث افزایش سطح خونی دینوژست شود.

### عوارض جانبی:

افزایش وزن

دردهای شکمی و تهوع

سرداد و میگرن

ریزش مو وجوش

احساس ناراحتی و درد در سینه ها

گرگرفتگی

خون ریزی واژینال و لکه بینی

### بسته بندی و شرایط نگهداری:

هر ۱۰ عدد قرص دینوژست در یک بلیستر و هر ۳ بلیستر همراه یک برگه در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

مصرف کننده محترم از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت، با شماره تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ الی ۴ بعد از ظهر پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

شرکت داروسازی ابوریحان تهران-ایران





# Dinovel 2 mg

## Dienogest

**Drug category:**

Synthetic progestogen, antiandrogen

**Indications:**

Treatment of endometriosis (painful symptoms due to displaced tissue of the lining of the womb).

**Mechanism of action:**

Dienogest acts on endometriosis by reducing the endogenous production of oes- tradiol and thereby suppressing the trophic effects of estradiol on both the eutopic and ectopic endometrium.

**Dosage and administration:**

Start treatment with dienogest on any day of natural cycle.

Adults: take one tablet every day, preferably at the same time. When a pack is finished the next one should be started without interruption. There is no experience with dienogest treatment > 15 months in patients with endometriosis.

If dienogest is forgotten or vomiting or severe diarrhoea has occurred, dienogest will be less effective if you miss a tablet. If you miss one or more tablets, take one tablet only as soon as you remember, and then continue next day taking the tablet at your usual time. If you vomit within 3-4 hours of taking dienogest or you have severe diarrhoea, you should take another tablet as soon as possible.

**Contraindications:**

Dienogest should not be used in the presence of any of the conditions:

- Known or suspected pregnancy
- Lactation
- Active venous thromboembolic disorder
- Arterial and cardiovascular disease
- Diabetes mellitus with vascular involvement
- Liver tumors (benign or malignant)
- Known or suspected sex hormone-dependent malignancies
- Undiagnosed vaginal bleeding
- Hypersensitivity to the Dienogest

**Drug and food Interactions:**

Interactions can occur with drugs:

- Phenytoin
- Barbiturates
- Primidone
- Carbamazepine
- Ketconazole
- Itraconazole
- Erythromycin
- Ritonavir

During dienogest treatment, you should avoid drinking grapefruit juice, because this may increase the levels of dienogest in your blood.

**Warnings and precautions:**

Do not use hormonal contraceptives of any form (tablet, patch, intrauterine system) while taking dienogest. Dienogest is not a contraceptive. If you want to prevent pregnancy, you should use condoms or other nonhormonal contraceptive precautions.

Tell your physician if any of the following conditions applies to you:

- venous thromboembolism or anyone in your immediate family early age
- have a close relative who has had breast cancer
- depression
- high blood pressure or develop high blood pressure while taking dienogest
- developed a liver disease while taking dienogest
- diabetes or had diabetes temporarily during previous pregnancy
- chloasma (golden-brown patches on the skin, particularly of the face); if so, avoid too much exposure to the sun or ultraviolet radiation
- lower abdomen pain while taking dienogest
- While taking dienogest your chance of becoming pregnant is reduced because dienogest may affect ovulation. If you become pregnant while taking dienogest you are at a slightly increased risk of having an extrauterine pregnancy (the embryo develops outside the womb). Tell your doctor before you start taking dienogest, if you had an extrauterine pregnancy in the past or have an impaired function of the Fallopian tubes.

**Laboratory tests:**

If you need a blood test, tell your doctor or the laboratory staff that you are taking dienogest.

Do not take dienogest if you are pregnant or breast-feeding. Common (1-10 in every 100 users)

- weight gain
- headache or migraine
- nausea, abdominal pain
- acne or hair loss
- back pain
- breast discomfort, ovarian cyst or hot flushes
- uterine/vaginal bleeding including spotting

**Packaging and Storage:**

Each 10 Tablets are in a blister and 3 blisters with a leaflet are in box.

Store under 30°C in the original package and protect from light and moisture .



Aburaihan Pharma.Co.Tehran-Iran



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.