



مشخصات دارو

هر کپسول حاوی ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلی گرم آتازاناویر به عنوان ماده موثره می باشد.

مورد مصرف

آتازاناویر در ترکیب با سایر داروهای ضد ویروسی برای درمان عفونت HIV-۱ برای بیماران ۳ ماهه و بالاتر با وزن حداقل ۵ کیلوگرم استفاده می شود.

موارد منع مصرف

در صورت وجود موارد زیر آتازاناویر منع مصرف دارد:

• اگر به آتازاناویر یا هر یک از مواد تشکیل دهنده آن حساسیت دارید.

• اگر داروهای زیر را مصرف می کنید:

آتازاناویر ممکن است در اثر استفاده همزمان با این داروها عوارض جانبی جدی داشته باشد و یا منجر به مرگ شود: سیزاپراید، لوواستاتین، داروهای ارگوت از جمله: (ارگوتامین، تارتارات، دی هیدروارگوتامین، مزیتلات، متیل ارگونوین)، میدازولام، پیموزاید، لورازیدون (در صورت استفاده آتازاناویر به همراه ریتوناویر)، ایرینوتکان، ریفامپین، سیلدنافیل (مورد استفاده در فشار خون شریانی ریوی)، سیمواستاتین، گیاه درخت علف چای، تریازولام

موارد بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن در هنگام مصرف آتازاناویر را دارید، با پزشک خود مشورت نمایید.

اگر آتازاناویر مصرف می کنید، از شیردهی خودداری نمایید. دارو به درون شیر مادر ترشح می شود. به دلیل ابتلا به HIV-1 و به دلیل خطر انتقال ویروس به نوزاد، از شیردهی خودداری نمایید.

موارد هشدار و احتیاط

قبل از مصرف کپسول آتازاناویر، با پزشک خود مشورت نمایید اگر:

مشکلات قلبی، مشکلات کبدی (از جمله هپاتیت B یا C)، دیابت و هموفیلی دارید.

باردار هستید یا قصد بارداری دارید.

در حال شیردهی هستید و یا قصد شیردهی دارید.

در مورد روش های پیشگیری از بارداری در طول درمان با کپسول های آتازاناویر، با پزشک خود مشورت نمایید.

اثر بخشی اشکال هورمونی پیشگیری از بارداری مانند تزریقی، حلقه های واژن یا ایمپلنت، پیچ پیشگیری از بارداری.

و برخی از قرص های ضد بارداری ممکن است در طول درمان با آتازاناویر کاهش یابد.

۲ ساعت قبل یا بعد از مصرف این دارو، از مصرف داروهایی که برای درمان سوء هاضمه بکار می روند خودداری نمایید.

قبل از مصرف داروهای بدون نسخه، از پزشک یا داروساز خود سوال نمایید.

تداخلات دارویی

سیزاپراید، لوواستاتین، داروهای ارگوت از جمله: (ارگوتامین، تارتارات، دی هیدروارگوتامین، مزیتلات، متیل ارگونوین)، میدازولام، پیموزاید، لورازیدون (در صورت استفاده آتازاناویر به همراه ریتوناویر)، ایرینوتکان، ریفامپین، سیلدنافیل (مورد استفاده در فشار خون شریانی ریوی)، سیمواستاتین، گیاه درخت علف چای، تریازولام، وارفارین، آمیودارون، قرص های ضد بارداری، دیگوکسین، دفراز پروکس، اپلرون، تنوفویر دیسوپروکسیل فومات، تولترودین، تیزانیدین، تاکرولیموس

مقدار و نحوه مصرف دارو

آتازاناویر را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.

• دوز درمانی خود را تغییر ندهید و یا مصرف آتازاناویر را متوقف نکنید، مگر به تشخیص پزشک متخصص

• در طول درمان با آتازاناویر تحت مراقبت پزشک خود باشید.

• آتازاناویر به صورت ترکیبی با سایر داروهای ضد ویروسی استفاده می شود.

• آتازاناویر را روزانه ۱ بار همراه با غذا میل کنید. کپسول را بلعید واز باز کردن آن خودداری نمایید.

• اگر مصرف یک دوز از آتازاناویر را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. سپس دوز بعدی را در زمان

معمول خود مصرف کنید. از ۲ برابر کردن دوز خودداری نمایید.

• اگر بیش از حد آتازاناویر مصرف کردید، با پزشک معالج خود تماس بگیرید یا سریعاً به نزدیکترین مرکز اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.

عوارض جانبی

عوارض جانبی شایع

حالت تهوع، سرگیجه، سردرد، درد عضلانی، درد معده، اسهال، استفراغ، افسردگی، اختلال در خواب، تب، بی حسی،

سوزن سوزن شدن و سوزش دست و پا.

عوارض جانبی غیر شایع

رویه های غیر طبیعی، درد قفسه سینه، اختلال رفتاری، اختلالات کیسه صفرا، گاستریت، ژنیکوماستی، خونریزی، از دست

دادن حافظه، میوپاتی، پروتئینوری، سنکوپ و تکرر ادرار.

عوارض جانبی نادر یا بسیار نادر

راه رفتن غیر طبیعی، ورم، تپش قلب، درد کلیه، گشاد شدن عروق

هرگونه عارضه جانبی که به صورت جدی بروز یابد یا ادامه یابد، به پزشک خود اطلاع دهید، از جمله: تغییر ریتم قلب،

بثورات پوستی، زرد شدن پوست یا قسمت سفید چشم، مشکلات کبدی، سنگ کلیه، کیسه صفرا، دیابت (هایپر گلیسمی)،

تغییر در سیستم ایمنی بدن، تغییر در چربی بدن، افزایش خونریزی.

شرایط نگهداری دارو

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.





Ativir 150 mg
Ativir 200 mg
Atazanavir
Capsules

Description

Each capsule contains 150 or 200 mg Atazanavir as an active ingredient.

Indications

Atazanavir is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of HIV-1 infection for patients 3 months and older weighing at least 5 kg.

Contraindications

Do not take Atazanavir capsule if:

- You are allergic to atazanavir or any of the ingredients in it.
- You are taking any of the following medicines. Atazanavir may cause serious life-threatening side effects or death when used with these medicines: cisapride, lovastatin, ergot medicines including: (ergotamine tartrate, dihydroergotamine mesylate, methylergonovine), lurasidone (if Atazanavir is coadministered with ritonavir), irinotecan, midazolam, pimozone, rifampin, sildenafil (when used for the treatment of pulmonary arterial hypertension), simvastatin, St. John's wort (Hypericum perforatum), triazolam.

Pregnancy & Breastfeeding

Talk to your healthcare provider about taking Atazanavir during your pregnancy or if you are planning to become pregnant while you are taking Atazanavir.

Do not breastfeed if you are taking Atazanavir. You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk of passing.

Warnings & Precautions

Before taking Atazanavir capsules, tell your healthcare provider if you:

- have heart problems
- have liver problems, including hepatitis B or C virus infection.
- have diabetes
- have hemophilia
- have any other medical conditions
- are pregnant or plan to become pregnant.
- are breastfeeding or plan to breastfeed.

Talk to your healthcare provider about forms of birth control that may be used during treatment with Atazanavir capsules. Hormonal forms of birth control, such as injections, vaginal rings or implants, contraceptive patch, and some birth control pills may not work during treatment with Atazanavir.

Drug Interactions

Cisapride, lovastatin, ergot medicines including: (ergotamine tartrate, dihydroergotamine mesylate, methylergonovine), lurasidone (if Atazanavir is coadministered with ritonavir), irinotecan, midazolam, pimozone, rifampin, sildenafil (when used for the treatment of pulmonary arterial hypertension), simvastatin, St. John's wort (Hypericum perforatum), triazolam, warfarin, amiodarone, contraceptives, digoxin, deferasirox, eplerenone, tenofovir disoproxil fumarate, tolterodine, tizanidine, tacrolimus.

Dosage & Administration

- Take Atazanavir exactly as your healthcare provider tells you to.
- Do not change your dose or stop taking Atazanavir unless your healthcare provider tells you to.
- Stay under the care of your healthcare provider during treatment with Atazanavir.
- Atazanavir must be used with other antiretroviral medicines.
- Take Atazanavir 1 time each day with food. Swallow the capsules whole. Do not open the capsules.
- If you miss a dose of Atazanavir, take it as soon as you remember. Then take the next dose at your regular time. Do not take 2 doses at the same time.
- If you take too much Atazanavir, call your healthcare provider or go to the nearest hospital emergency room right away.

Side effects

The most common side effects of Atazanavir include:

Nausea, dizziness, headache, muscle pain, stomach pain, diarrhea, vomiting, depression, trouble sleeping, fever, numbness, tingling, or burning of hands or feet.

Uncommon

Abnormal dreams, chest pain, disorientation, gallbladder disorders, gastritis, gynaecomastia, haematuria, memory loss, myopathy, proteinuria, syncope, urinary frequency increased.

Rare or very rare

Gait abnormal, oedema, palpitations, renal pain, vasodilation.

Atazanavir can cause serious side effects, including:

heart rhythm change, Skin rash, yellowing of skin or the white part of eyes, liver problems, kidney stones, gallbladder, diabetes (hyperglycemia), changes in immune system, changes in body fat, increased bleeding.

Tell your healthcare provider if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

Storage

Store below 30°C and protect from light and moisture.

Keep out of the sight and reach of children.



Aburaihan Pharma.Co.Tehran-Iran



Aburaihan
Pharmaceutical Co.