

# دزوناید ۵۰/۵ درصد

کرم و پماد دزوناید ۵۰/۵ درصد

## مشخصات محصول:

هر ۱۰۰ گرم کرم و پماد دزوناید حاوی ۵۰/۵ گرم دزوناید به عنوان ماده موثره می باشد.

## دسته دارویی:

کورتیکواستروئید موضعی

## راهنمای عمومی برای بیمار:

قبل از مصرف کرم یا پماد دزوناید، بروشور اطلاعات دارو را به دقت مطالعه فرمایید و تا پایان دوره آن را نزد خود نگه دارید. در صورت داشتن هر گونه سابقه حساسیت، قبل از مصرف با پزشک معالج خود، مشورت کنید. چنانچه به محصولات پوستی دیگر حساسیت دارید؛ قبل از مصرف این دارو، آن را روی بخش کوچکی از پوست خود، تست کنید و در صورت بروز علائم حساسیت، از مصرف آن صرف نظر کنید.

## موارد مصرف:

کرم و پماد دزوناید به منظور درمان قرمزی، تسکین التهاب و خارش در بیماری های پوستی اگزما و پسوریازیس مورد مصرف قرار می گیرد. این دارو با محدود کردن رگ های خونی پوست، از انتشار مواد شیمیایی که موجب قرمزی و تورم می شود، جلوگیری می کند.

## موارد منع مصرف:

در موارد زیر از مصرف کرم و پماد دزوناید خودداری نمایید:  
• اگر به دزوناید یا هریک از مواد تشکیل دهنده این کرم و پماد، حساسیت دارید.  
• در مواردی مانند تبخال، خالکوبی، آبله مرغان، عفونت های قارچی، آکنه ویا آکنه روزاسه از مصرف دارو خودداری نمایید و بایستی قبل از مصرف دارو با پزشک معالج مشورت نمایید.  
• در کورکان زیر ۲ سال.

## بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری، شیردهی ویا تصمیم برای باردار شدن با احتمال بارداری، قبل از مصرف کرم یا پماد دزوناید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است. از آنجایی که بسیاری از داروها ممکن است در شیر ترشح شوند، بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

## کودکان

کودکان ممکن است نسبت به داروهای کورتیکواستروئید حساس تر باشند بنابراین قبل از مصرف این دارو حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

## موارد هشدار و احتیاط:

• بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.  
• از تماس دارو با چشمها، بینی و دهان اجتناب کنید.  
• در صورت مشاهده علائم حساسیت به دارو نظیر سوزش، قرمزی و التهاب پوستی از ادامه مصرف خودداری کنید.  
• در صورت عدم بهبود علائم و یا بدتر شدن شرایط با پزشک معالج خود تماس بگیرید.  
• در صورت بلع فوراً با پزشک تماس بگیرید.  
• از گذاشتن پانسمان بر روی موضع خودداری کنید.

## تداخلات دارویی:

اگر همراه با کرم یا پماد دزوناید اقدام به مصرف داروی دیگری می کنید یا قصد مصرف داروی دیگری را دارید یا اخیراً داروی خاصی را مصرف کرده اید، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. فهرست کلیه داروهای مصرف خود (غیر نسخه ای، گیاهی و...) را در اختیار پزشک قرار دهید. ممکن است برخی از داروها با این کرم یا پماد، تداخل داشته باشند. در صورت استفاده از داروهای زیر با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید:  
• کورتیکواستروئیدهای خوراکی (پردنیزولون و...)  
• کورتیکواستروئیدهای موضعی (هیدروکورتیزون و...)  
• داروهایی که سیستم ایمنی بدن را سرکوب می کنند. (سیکلواسپورین و...)

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

این دارو را طبق نظر پزشک مصرف نمایید و فقط برای استعمال خارجی است و از مصرف آن در چشمها، دهان و بینی باید خودداری شود.  
• استفاده از این دارو در درمان زخم ها و بریدگی های عمیق مجاز نمی باشد.  
• دست ها را قبل و بعد از مصرف شستشو دهید. چنانچه این دارو را بر روی دست استفاده می کنید بعد از مصرف دست را نشویید.  
• میزان کافی از دارو را معمولاً دو تا چهار بار در روز روی پوست مالش دهید تا موضع مورد نظر التیام یابد. قبل از استفاده از این دارو ناحیه آسیب دیده را کاملاً شسته و خشک کنید و سپس کرم یا پماد را روی محل آسیب دیده بمالید.

## عوارض جانبی:

مانند سایر داروها، پماد و کرم دزوناید نیز می تواند منجر به عوارضی شود که این عوارض ناخواسته در افراد مختلف یکسان نمی باشد.

در صورت بروز هریک از علائم زیر با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.  
واکنش های حساسیتی مانند خارش، کهیر، بثورات پوستی، سوزش پوست، خشکی و قرمزی پوست، آکنه

## شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.  
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ابوریحان  
شرکت داروسازی  
تهران-ایران



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.

# Desonide 0.05%

## Desonide 0.05% Cream & Ointment

### Description

Each 100 g of Desonide cream and ointment contains 0.05 g of Desonide as an active ingredient.

### Category

Topical Corticosteroids

### Indication

Desonide is used for treatment of the redness, swelling and itching that is associated with a number of skin ailments such as eczema and psoriasis. It acts by constricting the blood vessels of the skin and affects the release of natural chemicals which cause redness and swelling.

### Contraindications

- Do not use Desonide if you have ever had an allergic reaction to any of the ingredients of product.
- Do not use Desonide if you have a viral skin infection (such as cold sores, shingles or chicken pox), a fungal skin infection (such as ringworm, thrush or tinea), or acne or rosacea unless your doctor tells you to. Check with your doctor to make sure you do not have any of these conditions.
- Do not apply to children under 2 years of age.

### Pregnancy and Breastfeeding

Pregnancy Category C

Tell your doctor if you are pregnant or plan on getting pregnant. You will need to talk about the benefits and risks of using Desonide topical while you are pregnant.

Tell your doctor if you are breast-feeding. You will need to talk about any risks to your baby.

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Desonide cream or ointment, should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. Many drugs are excreted in human milk; caution should be exercised when Desonide cream or ointment, is administered to a nursing woman.

### Warnings and Precautions

Patients using topical corticosteroids should receive the following information and instructions:

- This medication is to be used as directed by the physician. It is for external use only. Avoid contact with the eyes.
- This medication should not be used for any disorder other than that for which it was prescribed.
- The treated skin area should not be bandaged or otherwise covered or wrapped so as to be occlusive unless directed by the physician.
- Patients should report to their physician any signs of local adverse reactions.
- If swallowed, get medical help.

### Interactions

Your doctor or pharmacist may already be aware of any possible drug interactions and may be monitoring you for them. Do not start, stop, or change the dosage of any medicine before checking with your doctor or pharmacist first.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist of all prescription and nonprescription/herbal products you may use, especially of: oral corticosteroids (e.g., prednisone), other topical corticosteroids (e.g., hydrocortisone), drugs that suppress the immune system (e.g., cyclosporine).

### Dosage & Administration

Use Desonide as ordered by your doctor. Read all information given to you. Follow all instructions closely.

Use on your skin only. Keep out of your mouth, nose, and eyes.

Wash your hands before and after use. Do not wash your hands after use if putting this on your hand.

Clean affected part before use. Make sure to dry well.

Put a thin layer on the affected skin and rub in gently.

If you are using under a diaper, change the diaper often. Clean the affected area and allow it to dry. Use the drug with each diaper changed, especially at bedtime.

Children

Children may be more sensitive to the effects of too much corticosteroid medication. Consult your doctor for more details.

### Side Effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Desonide topical may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are severe or do not go away:

Stinging, burning, irritation, peeling, dryness, and redness of the skin, itching, acne, tiny red bumps or rash around the mouth small white or red bumps on the skin change in skin color.

If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

### Storage

Store below 30°C, protect from freezing.

Keep this medicine out of reach of children.



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.  
Tehran-Iran



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.