



آدوان® ۱۶۰، ۸۰، ۴۰

والسارتان

قرص روکشدار آدوان® (والسارتان) ۱۶۰ و ۸۰، ۴۰ میلی گرم

دسته دارویی:

ضد فشار خون (آنتاگونیست گیرپپتیدی آنژیوتانسین II دریافت‌هایی همانند عضلات صاف عروق و غدد فوق کلیه)

موارد مصرف:

- درمان فشار خون (به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر عوامل ضد فشار خون) آدوان® در صورت عدم اثربخشی دیورتیک‌ها و بتابلاکرها و نیز بروز عوارض جانبی غیرقابل تحمل آن برای بیمار فشار خونی تجویز می‌گردد.
- نارسایی قلبی
- متعاقب انفارکتوس قلبی (جهت کاهش مرگ قلبی - عروقی)

موارد منع مصرف:

- حساسیت به والسارتان
- دهیدراتاسیون متعاقب تعریق شدید، استفراغ، اسهال، درمان طولانی مدت با دیورتیک‌ها، دیالیز و مصرف رژیم کم نمک
- نقص عملکرد کبد
- نقص عملکرد کلیه

عوارض جانبی:

- عوارض نیازمند به توجهات پزشکی: آنژیوادم و افت فشار خون
- عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن: درد شکم، درد مفاصل یا پشت، سرفه، فارنژیت، یبوست، اسهال، خستگی دهان، سرگیجه، خستگی، سردرد، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، عفونت‌های ویروسی، تپش قلب، راش پوستی، هیپرکالمی، اضطراب، بی‌خوابی، تنگی نفس، آلوپسی و ورتیگو

موارد هشدار و احتیاط:

- لزوم مراجعه منظم به پزشک به منظور بررسی سیر درمان
- مراجعه بلافاصله به پزشک در صورت وجود احتمال بارداری
- عدم مصرف هرگونه دارو همزمان با والسارتان مگر با تجویز پزشک
- رعایت احتیاط در حین رانندگی و سایر فعالیت‌های نیازمند هوشیاری
- رعایت احتیاط در حین ورزش و در معرض گرما بودن به دلیل بروز دهیدراتاسیون
- رعایت احتیاط در مورد تجویز آدوان® در بیماران مبتلا به نقص عملکرد کبد یا کلیه

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

- درمان فشار خون: ۸۰ میلی گرم، یک بار در روز (در بیماران که دچار کاهش حجم پلاسما نمی‌باشند) به منظور افزایش اثربخشی دارو ممکن است دوز آن از ۱۶۰ تا ۳۲۰ میلی گرم افزایش یابد و یا یک دیورتیک اضافه شود.
- درمان نارسایی قلبی: ۴۰ میلی گرم، دو بار در روز که بنا بر میزان تحمل بیمار حداکثر از ۱۶۰ تا ۳۲۰ میلی گرم، دو بار در روز قابل افزایش است.
- پس از انفارکتوس قلبی: آدوان® در طی ۱۲ ساعت اول پس از رخ دادن انفارکتوس تجویز می‌گردد. میزان مصرف در ابتدا ۲۰ میلی گرم، دو بار در روز است که به فاصله یک هفته به ۴۰ میلی گرم، دو بار در روز افزایش می‌یابد. در صورت تحمل بیمار، این میزان تا ۱۶۰ میلی گرم، دو بار در روز، قابل افزایش است.

کودکان:

اثربخشی و بی‌خطر بودن این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخلات دارویی:

- در مصرف همزمان با:
- دیورتیک‌ها: تشدید اثر کاهندگی فشار خون آدوان®
- نمک‌های لیتیوم: کاهش کلیرانس لیتیوم
- داروهای حاوی پتاسیم: افزایش سطح پتاسیم سرم
- وارفارین: افزایش زمان انعقاد

مصرف در بارداری و شیردهی:

«رده بارداری C در سه ماهه اول و D در سه ماهه دوم و سوم»
داروهایی که مستقیماً بر سیستم رنین-آنژیوتانسین موثرند می‌توانند موجب بروز مرگ جنین گردند، بنابراین مصرف آدوان® باید به محض تشخیص بارداری قطع شود، حتی اگر درمان دیگری جایگزین نشود.
با وجود عدم اطمینان از امکان ترشح آدوان® در شیر، به دلیل ایجاد عوارض جانبی حایز اهمیت توسط این دارو، تجویز آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

- هر ۱۰ عدد قرص ۴۰ میلی گرمی (به رنگ سفید) و یا ۸۰ میلی گرمی (به رنگ صورتی) آدوان® در یک بلیسترو هر ۱۰ بلیستربه همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.
- هر ۱۰ عدد قرص ۱۶۰ میلی گرمی (به رنگ هلوئی) در یک بلیسترو هر ۳ بلیستربه همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران - ایران

شرکت داروسازی
ابوریحان



Aburaihan
Pharmaceutical Co.