


نکسیستور ۲۰ و ۴۰

اس امپرازول
کپسول های انتریک کوتد



دسته دارویی

مهار کننده پمپ پروتون

موارد مصرف

درمان سوزش سر دل و سایر علائم بیماری GERD (رفلاکس گاستروازوفاجیال)، ازوفازیت، درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری (همراه با کلاریترومایسین و آموکسی سیلین) و زخم های دئودنال ناشی از آن، کاهش احتمال بروز زخم های گوارشی متعاقب مصرف NSAID ها، درمان سندرم زولینگرالیسون

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو

عوارض جانبی

سر درد، سرگیجه، خواب آلودگی، آریتمی، آلوپسی، اریتم مولتی فرم، هایپرهیدروز، حساسیت به نور، سندرم استیون جانسون، نکرولیز توکسیک اپیدرمال، دوبینی، نفخ، درد شکم، سوء هاضمه، تهوع، اسهال، خشکی دهان، یبوست، کاندیاز دستگاه گوارش، التهاب پانکراس التهاب معده، اختلال حس چشایی، ژنیکوماستی، نفرت، انسفالوپاتی، هپاتیک، نقصان عملکرد کبد، هپاتیت همراه یا بدون ایجاد یرقان، آگرانولوسیتوز، کاهش غیر طبیعی تمام سلول های خونی، ایجاد تغییر در پاسخ برخی تست های آزمایشگاهی، ضعف عضلات، میالژی، سینوزیت، عفونت مجرای تنفسی برونکواسپاسم، واکنش های آنافیلاکتیک

مقدار مصرف دارو

بهترین زمان استفاده از دارو حداقل ۱ ساعت قبل از غذا (یا معده خالی) می باشد.

ازوفازیت:

بزرگسالان: روزانه یک مرتبه، ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم به مدت ۸-۴ هفته (در صورت عدم مشاهده بهبود علائم، این دوره درمان قابل تکرار است)

کودکان ۱-۱۱ ساله با وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم: روزانه یک مرتبه، ۱۰ میلی گرم به مدت ۸ هفته

کودکان با وزن ۲۰ کیلوگرم یا بیشتر: روزانه یک مرتبه، ۲۰-۱۰ میلی گرم به مدت ۸ هفته

درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری و کاهش احتمال بروز زخم های دئودنال:

بزرگسالان: روزانه یک مرتبه، ۴۰ میلی گرم به مدت ۱۰ روز (همراه با ۱۰۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین ۲ بار در روز و ۵۰۰ میلی گرم کلاریترومایسین ۲ بار در روز، هر دو با دوره درمانی ۱۰ روزه)

حفظ بهبود بیماری ازوفازیت:

بزرگسالان: روزانه یک مرتبه، ۲۰ میلی گرم

سندرم زولینگرالیسون:

بزرگسالان: روزانه دو مرتبه، ۴۰ میلی گرم

کاهش ریسک بروز زخم های گوارشی متعاقب مصرف NSAID ها:

بزرگسالان: روزانه یک مرتبه، ۴۰-۲۰ میلی گرم تا ۶ ماه

درمان کوتاه مدت بیماری GERD:

کودکان ۱۷-۱۲ ساله: روزانه یک مرتبه، ۴۰-۲۰ میلی گرم تا ۸ هفته

کودکان ۱۱-۱ ساله: روزانه یک مرتبه، ۱۰ میلی گرم تا ۸ هفته

Symptomatic GERD

بزرگسالان: روزانه یک مرتبه، ۲۰ میلی گرم به مدت ۴ هفته

(در صورت عدم مشاهده بهبود علائم، این دوره درمان قابل تکرار است)

نکته: غیر از موارد فوق الذکر در مورد تجویز این دارو در کودکان (یک ساله و بزرگتر)، اثر بخشی و موثر بودن این دارو در مورد آنها تایید نگردیده است.

تداخل های دارویی

در مصرف همزمان با:

الزاناویر، نلفیناویر، کلاریترومایسین، ووریکونازول، دیازپام، داروهای با فراهم زیستی مرتبط با PH (مانند

دیگوکسین، نمک های آهن و کتوکونازول)، تولترودین، وارفارین

مصرف در حاملگی و شیردهی:

رده بارداری B

احتمال ترشح این دارو در شیر نامعلوم است.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

کپسول های نکسیستور (انتریک کوتد) در دوز های ۲۰-۴۰ میلی گرمی در بسته بندی ۲۸ عددی در یک قوطی به همراه یک بروشور و یک بسته سلیکاژل در یک جعبه بسته بندی می گردد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم، شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد

به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی

سوال های علمی شما عزیزان است.

