

ناندربولون دکانونات

محلول تزریقی دکابولکس®

مشخصات دارو:

هر آمپول دکابولکس ۲۵ و ۱۰۰ حاوی ۲۵ یا ۱۰۰ میلی گرم ناندربولون دکانونات به عنوان ماده فعال و ۱۰۰ میلی گرم بنزیل الکل به عنوان ماده نگهدارنده در هر میلی لیتر می باشد.

دسته دارویی:

آنابولیک استروئیدی

نحوه عملکرد و فارماکوکینتیک:

استروئیدهای آنابولیک روندهای کاتابولیکی را عکس نموده و توازن منفی نیتروژن را بوسیله تحریک اشتها و جلوگیری از تجزیه پروتئین (در صورت دریافت مناسب پروتئین و کالری) ایجاد می نمایند.

خاصیت خون سازی:

ناندربولون تولید اریتروپوئیتین توسط کلیه را تحریک می نماید که به افزایش میزان و حجم گلبولهای قرمز خون منجر می شود.

موارد مصرف:

در پوکی استخوان و سرطان متاستاتیک پستان در بعد از دوران یائسگی و نیز کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیه استفاده می گردد.

موارد منع مصرف:

مردان مبتلا به سرطان سینه، بیماریهای کبدی، بیماری شدید کلیوی یا قلبی، دوران حاملگی یا شیردهی، خونریزی غیرطبیعی و تشخیص داده نشده واژن.

هشدارها و موارد احتیاط:

در موارد نارسایی های قلبی - عروقی، نارسایی کلیوی، بیماری کبدی، در بیماران سرطانی که تحت مداوا می باشند، بیماران میگرنی و دیابتی با احتیاط مصرف شود.

همچنین با توجه به اینکه فراورده حاوی بنزیل الکل می باشد، به موارد زیر توجه شود:

۱- مقادیر زیاد بنزیل الکل (بیش از ۹۹ میلی گرم بر کیلوگرم در روز برای نوزادان و بیش از ۳۲ میلی گرم بر کیلوگرم در روز در خصوص نوزادان تازه متولد شده با وزن کم یا نوزادان نارس) با سمیت بالقوه کشنده "سندروم Gasping" همراه است.

"سندروم Gasping" شامل اسیدوز متابولیک، دیسترس تنفسی، اختلال عملکرد CNS (شامل تشنج، خونریزی داخل جمجمه)، افت فشار خون و کلاپس قلبی-عروقی است.

از مصرف فراورده در نوزاد تازه متولد شده (تا ۴ هفته) خودداری نمایید، مگر به تجویز پزشک متخصص.

۲- در کودکان (کمتر از ۳ سال) بیش از یک هفته مصرف نشود، مگر به تجویز پزشک متخصص.

۳- اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. زیرا تجمع بنزیل الکل در بدن می تواند باعث ایجاد عوارض جانبی (مانند اسیدوز متابولیک) گردد.

۴- اگر دچار بیماری کبدی یا کلیوی هستید در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. زیرا تجمع بنزیل الکل در بدن می تواند باعث ایجاد عوارض جانبی (مانند اسیدوز متابولیک) گردد.

عوارض جانبی:

پیدایش خصوصیات مردانه در زنان، بم شدن صدا و بزرگ شدن کلیتوریس، قاعدگی نامنظم، آکنه، پوست چرب، پرمویی، (در مردان) بسته شدن زودرس اپی فیز استخوان، نعوذ مکرر و مداوم، بزرگ شدن آلت تناسلی، بزرگ شدن پستان و ناتوانی جنسی، گاستروانتریت، مسمومیت کبدی و یرقان قابل برگشت، درد و سفتی در محل تزریق.

مقدار مصرف دارو:

دوز معمول بزرگسالان برای سرطان سینه (کنترل سرطان سینه متاستاتیک در زنان):

• ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم با تزریق عمیق عضلانی یک بار در هفته.

دوز معمول بزرگسالان برای کم خونی مرتبط با نارسایی مزمن کلیه:

• زنان: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم با تزریق عضلانی عمیق یکبار در هفته

• مردان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم با تزریق عضلانی عمیق یکبار در هفته

دوز معمول کودکان برای کم خونی مرتبط با نارسایی مزمن کلیه:

• ۲-۱۳ سال: ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم با تزریق عضلانی عمیق تا ۳ الی ۴ هفته

• ۱۳ سال >:

• زنان: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم با تزریق عضلانی عمیق یکبار در هفته

• مردان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم با تزریق عضلانی عمیق یکبار در هفته

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و درون جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

نوع بسته بندی:

۱۰ عدد آمپول در یک جعبه و هر آمپول یک میلی لیتری، حاوی ۲۵ یا ۱۰۰ میلی گرم ناندربولون دکانونات می باشد.

مصرف کننده محترم: از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است. شرکت داروسازی ابوریحان تهران - ایران