

سیپروترون کامپاند

قرص پوششدار سیپروترون کامپاند حاوی اتینیل استرادیول ۰/۰۳۵ میلی گرم + سیپروترون استات ۲ میلی گرم

دسته دارویی:

استروژن + ضد آندروژن

راهنمایی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

اختلال های ترومبوآمبولیک یا سابقه آن، ناراحتی های قلبی - عروقی (مانند فشار خون بالا، بیماری عروق کرونر)، اختلال های مغزی - عروقی، بدخیمی ها، بیماری کبدی یا سابقه آن، خونریزی غیرعادی مهبلی بدون علت مشخص،

دوران شیردهی و حاملگی:

- قبل از مصرف دارو بهتر است بیمار آزمایشات پزشکی را انجام و در صورت تکرار مصرف در دوره های شش ماهه مجددا کنترل گردد.
 - عدم وجود اختلالات انعقادی در بیمار باید مشخص گردد.
- مصرف این دارو در زنان بالای ۳۵ سالی که بیش از ۱۵ عدد سیگار در روز مصرف میکنند، ممنوع است.

عوارض جانبی دارو:

حالت تهوع، استفراغ، دردهای ناحیه شکم، تغییر در اشتها و وزن، تغییرات در پستان ها، خونریزی نامنظم (بین سیکل ها)، تغییر تمایل جنسی، ترشحات و آزردهای دهانه رحم، عدم تخمک گذاری، آمنوره، سرگیجه، سردرد، حالات افسردگی، گاهی عدم تحمل لنز در چشم و سرطان پستان توجه: اگر تا پیش از ۳ ساعت از مصرف دارو دچار استفراغ شدید، دارو در استفراغ دفع می شود. در این صورت دارو را دوباره مصرف کنید. ابتلا به سرطان پستان در زنانی که ریسک فاکتورهای ابتلا به سرطان پستان را دارند، محتمل است. بنابراین توصیه میشود آموزش های لازم جهت بررسی پستان ها به زنانی که دارو را مصرف میکنند توسط پزشک داده شود و بررسی بالینی سالیانه پستان ها نیز توسط پزشک متخصص صورت گیرد. در صورت لکه بینی و خونریزی نابهنگام دارو را قطع نکنید. در صورتی که خونریزی نابهنگام ادامه پیدا کرد، با پزشک متخصص مشورت کنید.

مقدار مصرف دارو:

- اولین دوره مصرف را از روز اول قاعدگی به صورت روزانه یک قرص شروع و تا ۲۱ روز ادامه دهید. این دارو باید در ساعت مشخص مصرف شود.
- بعد از اتمام بسته ۲۱ عددی به مدت یک هفته از خوردن قرص ها خودداری نموده و از روز هشتم بسته بعدی را آغاز نمایید و در دوره های بعدی نیز به همین ترتیب عمل کنید.

تداخلات دارویی:

این دارو با داروهای ریفامپیسین، باربیتورات ها، ضد صرع ها و سیکلوسپورین تداخل اثر دارد.

نوع بسته بندی:

۲۱ عدد قرص در یک بلیستر، در درون جعبه

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد و داخل جعبه نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

