

## قرص مارلین®

(کنتراسپتیو دی - ای)

### مشخصات دارو

قرص مارلین® حاوی ۲۱ عدد قرص می باشد که هر قرص حاوی ۱۵/۰ میلی گرم دزوژسترون و ۰۳/۰ میلی گرم اتینیل استرادیول می باشد.

### دسته دارویی

ضد بارداری خوراکی ( استروژن - پروژستین )

### موارد مصرف

جلوگیری از بارداری

### موارد منع مصرف

ترومبوفلیت، ترمبوز یا اختلالات ترمبو آمبولیک، بیماریهای عروقی- مغزی، سکنه قلبی، نارسایی قلبی، سرطان پستان یا احتمال ایجاد آن، سرطان آندومتر یا نئوپلازی وابسته به استروژن، تومور کبدی ( خوش خیم یا بد خیم )، بیماریهای کولستاتیک کبدی بارداری یا موارد مشکوک به بارداری، حساسیت به هر یک از اجزاء دارو ، خونریزی غیر طبیعی یا بدون تشخیص.

### بارداری و شیردهی

در دوران بارداری منع مصرف دارد.  
به دلیل ترشح در شیر مادر، در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

### موارد هشدار و احتیاط


کشیدن سیگار، خطر بروز عوارض قلبی - عروقی این دارو را افزایش می دهد. این خطر با افزایش سن ( خصوصا بالاتر از ۳۵ سال ) بیشتر میگردد.  
قبل از شروع مصرف، انجام بعضی تستها مانند سنجش فشار خون، معاینه پستانها و نیز تست پاپ اسمیر توصیه می گردد. همچنین لازم است در طی مدت مصرف این دارو تستهای مذکور سالیانه انجام گردند.

### عوارض جانبی

تهوع و استفراغ، افزایش خطر ابتلا به ترمبوفلیت، ترمبوز عروق کرونر و ترمبوز مغزی، افزایش فشار خون، بیماری کیسه صفرا، میگرن، افسردگی، سردرد، راش، حساسیت و دردناک شدن پستانها، بزرگ شدن پستانها، عدم تحمل به لنز های تماسی

### مقدار و نحوه مصرف دارو

مصرف این دارو باید مطابق دستور گرفته و فواصل مصرف قرص ها می بایست هر ۲۴ ساعت ۱ بار باشد.  
در صورت فراموش نمودن دوز مصرفی، مطابق با جدول زیر عمل نمایید.



### شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.  
دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت داروسازی  
**ابوریحان**



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.

# Marolin<sup>®</sup> Tablets

## Contraceptive DE

**Composition :**

Desogestrel 0.15 mg  
Ethinyl estradiol 0.03 mg

**Category:**

Oral contraceptive

**Indication :**

Prevention of pregeancy

Note: Before using Marolin<sup>®</sup>, it is a good medical practice for all women to have annual history and physical examintions, including evaluation of blood pressure, breasts, abdomen and pelvic organs including papsmear. Don't use ocp: for > 1 year without another physical exam.

**Contraindications:**

Thrombophlebitis, thromboembolic disorders, history of deep – vein thrombophlebitis, cerebral vascular disease, MI, coronary artery disease, known or suspected breast carcinoma or estrogen – dependent neoplasia, carcinoma of endometrium , hepatic adenomas / carcinomas, undiagnosed abnormal genital bleeding, known or suspected pregnancy, cholestatic jaundice of pregnancy, jaundice with prior pill use, hypersensitivity to any component of the product; acute liver disease.

**Pregnancy:**

(Category x )

Breast feeding: OCPs pass into the breast milk and can change the content or lower the amount of breast milk.

**Warnings and Precautions:**

In the presence of any of the conditions listed below you may need to be kept under close observation.

Smoking, long term use( the highest risk group includes women 40 – 49 years of age who used OCPs for >5 years ), Age ( the risk of cerebrovascular and circulatory disease increased in women >35), Postsurgical thromboembolism, subarachnoid hemorrhage , ocular lesions, diabetes, overweight, migraine, epilepsy, ulcerative colitis , sickle cell disease.

**Precautions:**

Monitoring: including physical exam.

Uterine fibroids, lipid disorders, Depression, fluid retention, contact lenses, serum folate levels may be depressed by therapy. (( folic acid supplements are recommended )).

**Drug interactions :**

Anticoagulants, OCPs, Antibiotics ( decrease in pharmacologic effects of the OCPs because of altered steroid gut metabolism secondary to changes in the intestinal flora ) .

Barbiturates, Carbamazepine, Griseofulvin, Hydantoins, Phenylbutazone, Phenytoin, Primidone, Rifampin, Protease inhibitors.

**Adverse reactions :**

Thrombophlebitis, venous thrombosis with or without embolism, pulmonary embolism, coronary thrombosis, MI, cerebral thrombosis, arterial thromboembolism, hypertension, gall bladder disease, hepatic adenomas, Migraine, depression, headache, dizziness, Melasma, rash, Breast tenderness, enlargement, Nausea and Vomiting, abdominal cramps, contact lens intolerance, Edema.

**Dosage and administrations :**

The Marolin<sup>®</sup> pack contains 21 tablets on the pack, each tablet is marked with the day of the week on which it is to be taken.

Take your tablet at about the same time each day, with food to help prevent nausea that might occur during the first few weeks. Follow the direction of the arrows until all 21 tablets have been taken. During the next days you take no tablet.


Start taking your next 7 pack on the 8th day.

Starting your first pack of marolin:

- 1 – No hormonal OCPs has been used in the past: start taking Marolin<sup>®</sup> on the first day of your cycle . ( first day of menstrual bleeding . )
- 2 – changing from another combined pill: you can start taking Marolin<sup>®</sup> the day after you take the last tablet from your present pill pack .
- 3 – Changing from a progestron – only pill: you can stop taking progestron – only pill and start taking Marolin<sup>®</sup> the next day at the same time. but use an additional contraceptive method ( a barrier method ) for the first days of tablet – taking when having intercourse.
- 4 – Changing from an injectable or implant: start using Marolin<sup>®</sup> when your next injection is due or on the day that your implant is removed. but use an additional contraceptive method ( a barrier method ) for the first 7 days of tablet – taking when having intercourse.

Missed dose:

If you forgot any tablet, follow the table below:

**Storage :**

Store below 30 °C in a dry place and protect from light and moisture.  
Keep out of the reach of children .