



پسوریابت®

پماد موضعی (کلسی پوتریول ۰/۰۰۵ / درصد / بنامتازون ۰/۰۶۴ درصد)

دسته دارویی:

آنتی پسوریاتیک / کورتیکواستروئید

موارد مصرف:

درمان پسوریازیس و لگاریس

موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو، اختلالات متابولیسم کلسیم، ضایعات ویروسی پوست، عفونت های باکتریایی، قارچی و انگلی پوست بخصوص توپر کلوزیس و سیفلیس، رزاسه، درماتیت پری اورال، آکنه و لگاریس، آتروفی پوست، ضایعات آتروفیک، شکنندگی عروق پوستی، ایکتیوزیس، آکنه رزاسه، زخم و خارش تناسلی، پسوریازیس قطره ای اریترودرمیک، اگزفولیاتیو یا پوستولی، اختلالات شدید عملکرد کلیه یا کبد.

عوارض جانبی:

واکنش های آلرژیک مانند کهیر، تنگی نفس، تعرق صورت، لب ها و زبان، التهاب پوست در مناطق تحت درمان، بدتر شدن علائم یا پیشرفت بیماری پسوریازیس، چرک، تورم، قرمزی، خارش یا سایر علائم عفونت، گیجی، احساس تشنگی، خستگی مفرط، کاهش اشتها، کاهش وزن، عدم کفایت عملکرد غده فوق کلیه، تهوع، استفراغ، درد عضلات و مفاصل fainting، سندرم کوشینگ، افزایش وزن، کاهش حجم عضلات بازو و ران، نازک شدن پوست، آکنه، افزایش موی صورت، تیرگی یا تغییر رنگ پوست، افزایش قند خون، راش های پوستی، تورم فولیکول های مو.

موارد احتیاط:

بعد از استفاده از دارو دست ها را بشوئید. استعمال این دارو، در هر بار مصرف، روی بیش از یک سوم سطح پوست جایز نمی باشد. از تماس طولانی با نور آفتاب و اشعه UV بپرهیزید. از تماس دارو با مخاط جلوگیری شود. از مصرف این دارو در مناطقی از پوست که مبتلا به آفتاب سوختگی، خشکی شدید، زخم و التهاب می باشند اجتناب کنید. مصرف همزمان این دارو با سایر کورتیکواستروئیدها یا مصرف طولانی مدت این دارو می تواند موجب بروز عوارض موضعی یا سیستمیک کورتیکواستروئیدها گردد. در این موارد باید درمان متوقف گردد.

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱۸ سال: روزی یک بار به موضع مالیده شود. حداکثر دوره درمان ۴ هفته و حداکثر میزان مصرف دارو در هر هفته ۱۰۰ گرم می باشد. این دارو در افراد زیر ۱۸ سال تجویز نمی گردد.

تداخلات دارویی:

این دارو معمولاً نباید به صورت همزمان با سایر داروهای موضعی استفاده شود. در زمان استفاده از این دارو استفاده از سایر اقلام دارویی حتی داروهای گیاهی یا داروهای قابل تهیه بدون نیاز به تجویز پزشک (OTC) باید زیر نظر پزشک معالج صورت پذیرد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

رده بارداری C، تجویز این دارو در دوران بارداری و همچنین در دوران شیردهی تنها با صلاح دید پزشک معالج و در صورت غالب بودن مزایای این دارو برای مادر در مقابل خطرهای احتمالی آن برای جنین یا شیرخوار امکان پذیر است.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

- دارو را در دمای کمتر از 30°C ، نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- پس از هر بار مصرف دارو، در تیوب را محکم ببندید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پماد موضعی ۳۰ گرمی پسوریابت® به همراه بروشور در جعبه بسته بندی می گردد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سؤالات علمی شما عزیزان است.

ابوریحان
شرکت داروسازی
تهران-ایران



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

Psoriabet[®]

(Calcipotriol 0.005% / Betamethasone 0.064%)

Topical Ointment



Category: Antipsoriatic/ Corticosteroid

Indications: Betamethasone and calcipotriene is a combination drug used to treat psoriasis vulgaris (Topical treatment of stable plaque psoriasis vulgaris amenable to topical therapy).

Betamethasone and calcipotriene may also be used for other purposes not listed in this medication guide.

Drug Interactions:

Calcipotriol/Betamethasone must not be mixed with other medicinal products. There may be other drugs that can interact with betamethasone and calcipotriene. Tell your doctor about all the prescription and over the counter medications you use. This includes vitamins, minerals, herbal products and drugs prescribed by other doctors. Do not start using a new medication without telling your doctor.

Contraindications:

Hypersensitivity to any constituents, Patients with known calcium metabolism disorders, Viral skin lesions, fungal or bacterial skin infections, parasitic infections, skin manifestations in relation to tuberculosis or syphilis, rosacea, perioral dermatitis, acne vulgaris, atrophic skin, striae atrophicae, fragility of skin veins, ichthyosis, acne rosacea ulcers, wounds, perianal and genital pruritus. Guttate, erythrodermic, exfoliative of pustular psoriasis, severe renal insufficiency or severe hepatic disorders.

Precautions and Warnings:

Wash hands after applying. Avoid applying this medicine to more than one-third of your skin surface at any one time. Avoid exposure to sunlight or artificial UV rays (sunlamps or tanning beds). Betamethasone and calcipotriene topical can make your skin more sensitive to sunlight and sunburn may result. Use a sunscreen (minimum SPF 15) and wear protective clothing if you must be out in the sun. Avoid getting this medication in your eyes, mouth and nose, or on your lips. If it dose get into any of these areas, wash with water. Do not use this medicine on sunburned, windburned, chapped, irritated or broken skin, or on open wounds.

Also avoid using this medication in wounds or on areas of infection. Wait until these conditions have healed before using betamethasone and calcipotriene topical. Avoid concurrent treatment with other steroids. Adrenocortical suppression or impact on the metabolic control of diabetes mellitus may occur. With long-term use there is an increased risk of undesirable local and systemic corticosteroid effects in which case treatment should be discontinued.

Medical supervision should therefore continue in the post-treatment period. There may be a risk of rebound when discontinuing a long-term treatment with corticosteroids. No experience of use on scalp. No experience of concurrent use with other antipsoriatic products or phototherapy.

Pregnancy/Breast feeding:

FDA pregnancy category C. It is not known whether this medication is harmful to an unborn baby. Before using betamethasone and calcipotriene, tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. It is not known if betamethasone and calcipotriene pass into breast milk or if this medicine could harm a nursing baby.

Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby.

Side/Adverse effects:

Allergic reaction: hives, difficult breathing, swelling of your face, lips, tongue, or throat, severe skin irritation on treated areas, worsened symptoms or no improvement in psoriasis, pus, swelling, redness, increased itching or other signs of skin infection, confusion, thirst, extreme tiredness, lost appetite, weight loss, adrenal insufficiency nausea, vomiting joint/ muscle pain, feeling light-headed, fainting, cushing syndrome weight gain (especially in your face), thinning muscles in your arms or legs, easy bruising, thinning skin, acne, increased facial hair, darkened skin, high blood sugar (hyperglycemia), increased urination and thirst, burning or mild itching, red or scaly rash, swollen hair follicles, changes in the color of treated skin areas.

Dosage and Administration:

Psoriasis vulgaris, apply to the affected areas once daily for up to four weeks. The maximum weekly dose should not exceed 100g. Treated area should not be more than 30% of body surface.

Not recommended for use in people under 18 years.

Store below 30°C and protect from freezing.

keep the tube capped and tightly closed when not in use.



Aburaihan
Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran



Aburaihan
Pharmaceutical Co.