

پماد مدوپروک® ۰/۰۳ و ۰/۱ درصد

تاکرولیموس

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

یک لایه نازک از پماد مدوپروک® را دو بار در روز روی موضع آسیب دیده مالیده و به طور کامل و سریع ماساژ دهید. درمان را تا یک هفته پس از رفع کامل علائم ادامه دهید.

این دارو را نباید همراه با روکش در ناحیه مورد نظر به کار برد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری باید با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضرات مصرف آن باشد. این کار باید حتما با تشخیص و نظر پزشک انجام شود.

مصرف این دارو در دوران شیردهی با توجه به ترشح آن در شیر بایستی با قطع شیردهی همراه باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید:

سوختگی پوست، خارش، علائم شبیه سرماخوردگی، واکنشهای حساسیتی، اریتم پوستی، سردرد، عفونت پوستی، تب، افزایش سرفه، آسم، اگزما، فارنژیت، فولیکولیت، آبریزش بینی، عفونت گوش میانی، سینوزیت، اسهال، برونشیت، تهوع، درد شکم، درماتیت قارچی، گاستروانتریت، جوش، لنف آدنوپاتی، عدم ترشح اسید، خشک شدن پوست، درد کمر، ادم صورت، ادم محیطی، درماتیت تماسی، پنومونی، درماتیت اکسفولیاتیو، عقب افتادن پریود، درد عضلات، درد مفاصل، بالا رفتن بیلی روبین خون، ناراحتی دندانها و تعریق

هشدارها:

- مصرف این دارو فقط باید با تجویز پزشک انجام شود.
- این دارو یک داروی موضعی است و در صورتی که بر روی ناحیه دست مصرف می شود بایستی دستها را بعد از مالیدن پماد شست.
- از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب طبیعی یا نور مصنوعی UV اجتناب کنید.
- هر گونه نشانه ای از عوارض جانبی را به پزشک خود گزارش کنید.
- قبل از استفاده دارو از خشک بودن موضع مورد استفاده مطمئن شوید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها خصوصا اریتمو مایسین، ایتراکونازول، فلوکونازول، مهارکننده های کانالهای کلسیمی و سایمتیدین موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

پماد موضعی مدوپروک® ۰/۰۳ و ۰/۱ درصد به صورت تیوب های حاوی ۳۰ گرم پماد توسط شرکت داروسازی ابوریحان تولید می شود. هر تیوب به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم، شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۰۲۱-۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

