

پماد و کرم جلدی بتامتازون ۱/۰٪

بتامتازون والرات

مشخصات دارو:

در هر ۱۰۰ گرم پماد و کرم بتامتازون ۱/۰ گرم بتامتازون والرات به عنوان ماده فعال دارویی وجود دارد.

دسته دارویی:

ضد التهاب موضعی (کورتیکواستروئید)

موارد مصرف:

بتامتازون برای درمان علامتی اختلالات آلرژیک و یا التهابی پوست نظیر اگزما که به سایر کورتیکواستروئیدهای ضعیف تر پاسخ نمی دهند، انواع درماتیت، نیش حشرات و پسوریازیس به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

* از آنجایی که میزان جذب دارو از پوست به پایه مورد استفاده (کرم یا پماد)، مدت زمان تماس دارو با پوست، سطح تماس دارو با پوست و وضعیت پوست بستگی دارد. مقدار مصرف دارو برای بیمار

را پزشک تعیین می کند ولی میزان متعارف آن در کودکان یکبار در روز و کمتر از ۱۵ گرم در هفته و در بزرگسالان یک تا سه بار در روز و کمتر از ۵۰ گرم در هفته می باشد.

* در صورتی که یک نوبت استفاده از دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری استفاده کنید اما اگر نوبت بعدی فرا رسیده است از دو برابر نمودن دوز دارو خودداری نمایید.

توصیه های دارویی بتامتازون موضعی:

* از به کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه تحت درمان با بتامتازون خودداری شود. * در صورتی که با گذشت دو هفته عارضه ای که برای آن بتامتازون تجویز شده، بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد. «حتماً به پزشک اطلاع داده شود». * قبل از شیردهی از استعمال این دارو روی بافت پستان خودداری شود. * از مصرف دارو در اطراف چشم ها اجتناب شود.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به این دارو و سایر کورتیکواستروئیدها. * در صورت مصرف بعنوان داروی تک درمانی برای عفونت های باکتریایی نظیر زرد زخم. * در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

بارداری: رده C * استعمال این دارو در بارداری و شیردهی با احتیاط تنها با توصیه پزشک می باشد.

موارد هشدار و احتیاط:

* مصرف این دارو روی پوست کودکان باید با احتیاط صورت گیرد. * به دنبال مصرف این دارو ممکن است تست های بررسی عملکرد محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، غده فوق کلیوی دچار اختلال شود.

* مصرف مقادیر بیش از ۱۰۰ گرم در هفته از فرآورده ۱/۰٪ با احتمال تضعیف آدرنال همراه می باشد. * از مصرف طولانی مدت فرآورده روی پوست اجتناب گردد. * قدرت اثر پماد بیشتر از کرم می باشد

لذا مصرف پماد در صورت، زیر بغل و پهلوها توصیه نمی شود. * مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر به تشخیص پزشک متخصص. * طبق دستور از دارو استفاده کنید و از پانسمان خود سرانه ضایعه خودداری کنید (مگر به تشخیص پزشک متخصص). * پانسمان جذب دارو را خصوصاً در کودکان افزایش می دهد. * در موارد وجود عفونت از استروئیدها به همراه آنتی بیوتیک و یا داروهای ضد قارچ استفاده کنید. اگر نتیجه درمان رضایت بخش نباشد، مصرف استروئید را تا زمان درمان عفونت باید قطع نمود. * کورتیکو استروئیدها می توانند منجر به ایجاد گلوکوم و آب مروارید شوند، لذا در صورت مشاهده تغییر در بینایی در حین استفاده از این محصول، با پزشک خود مشورت کنید.

* استفاده طولانی مدت مداوم یا نامناسب از استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بازگشت علایم پس از قطع درمان شود (سندرم ترک استروئید موضعی). فرم شدیدی از بازگشت علایم که به صورت درماتیت همراه با قرمزی شدید، سوزش و گزگز است می تواند حتی در نواحی فراتر از نواحی درمان اولیه ایجاد شده و گسترش یابد. زمانی که دارو در نواحی که پوست نازک تر و ظریف تری دارند مانند صورت استفاده می شود، احتمال بروز این مشکل بیشتر است. در صورت بروز مجدد علائم طی چند روز تا چند هفته بعد از درمان موفق، می توانید احتمال وقوع این سندرم را در نظر بگیرید.

استفاده مجدد از این دارو می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص، پس از بررسی امکان استفاده از درمان های جایگزین انجام شود.

تداخلات دارویی:

استفاده از دو داروی کورتیکواستروئیدی موضعی بصورت هم زمان باعث تشدید عوارض جانبی می گردد.

سمیت / عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک مشورت کنید:

به دلیل کم بودن متابولیسم بتامتازون در پوست، امکان جذب سیستمیک آن زیاد می باشد و لذا بروز عوارضی نظیر سندرم کوشینگ، افزایش قند خون، وجود قند در ادرار و در دراز مدت تضعیف

محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- غده فوق کلیوی محتمل می باشد، همچنین بروز تاری دید و سرورز تینوپاتی مرکزی محتمل است.

شرایط نگهداری دارو:

* در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. * دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. * از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

* پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.

نوع بسته بندی:

هر جعبه حاوی یک عدد تیوب ۱۵ گرمی پماد یا کرم بتامتازون می باشد که در هر ۱۰۰ گرم بتامتازون ۱/۰ گرم بتامتازون والرات وجود دارد.

