

فرتیژست[®] آمپول

پروژسترون ۲۵ و ۵۰ میلی گرم در یک میلی لیتر

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۱۰ عدد آمپول یک میلی لیتری است. (آمپول روغنی فرتیژست[®] ۲۵ و ۵۰ به ترتیب حاوی ۲۵ و ۵۰ میلیگرم پروژسترون و ۱۰۳ میلی گرم بنزیل الکل به عنوان ماده نگهدارنده می باشد).

دسته دارویی:

هورمون های استروئیدی

موارد مصرف:

داروی حاضر با تجویز پزشک در آمنوره و درمان خونریزی غیر طبیعی رحم که به دلیل عدم تعادل هورمونی (و نه به دلیل وجود اختلال ارگانیکی مانند فیبروئید زیر مخاطی یا سرطان رحم) ایجاد شده باشند به کار می رود .

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- نارسایی یا بیماری کبدی ، سرطان سینه و یا اندامهای تناسلی ، اختلالات ترومبوآمبولی و ترومبوفلیت و خونریزی مغزی و یا سابقه آمبولی ریوی ، ترومبوزوریدی عمیق ، سکنه قلبی و خونریزی مغزی
- سقط جنین فراموش شده
- کودکان و نوزادان.

بارداری و شیردهی:

- پروژسترون ممکن است در دوران بارداری در زمانی که تولید پروژسترون طبیعی به میزان کافی صورت نمیگیرد، برای حفظ بارداری تجویز شود. ولی در مواقعی که تولید مقدار کافی پروژسترون در بدن صورت میگیرد، نباید مصرف شود.
- این دارو در شیر ترشح میشود. مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.
- اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. زیرا تجمع بنزیل الکل در بدن می تواند باعث ایجاد عوارض جانبی (مانند اسیدوز متابولیک) گردد.

هشدارها و احتیاطات:

- در صورت مشاهده موارد ذیل دارو فوراً قطع شود؛
کاهش شدید بینایی، بیرون آمدگی چشم، دوبینی، میگرن، نشانه های اولیه بروز اختلالات ترومبوتیک، اختلالات قلبی عروقی و فراموشی، کاهش تراکم استخوان.
- با توجه به احتباس مایعات، در نارسایی عملکرد کلیه، آسم، میگرن و تشنج با احتیاط مصرف شود.
- در بیماران افسرده، روند بیماری پایش شود.
- در بیماران دیابتی، قند خون کنترل گردد.
- ممکن است منجر به افزایش تری گلیسیرید و پانکراتیت گردد.
- در بیماران با هیپوکلسمی شدید با احتیاط مصرف شود.
- در بیماران لوپوس اریتماتوز با احتیاط مصرف شود.
- اگر دچار بیماری کبدی یا کلیوی هستید در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. زیرا تجمع بنزیل الکل در بدن می تواند باعث ایجاد عوارض جانبی (مانند اسیدوز متابولیک) گردد.

تداخلات دارویی:

ضد قارچ ها از دسته آزول ها، ریفامپین، افویرنز

مقدار و نحوه مصرف دارو:

شکل تزریقی دارو فقط برای تزریق عمیق عضلانی در نظر گرفته شده است . مقدار مصرف دارو برای بیمار را پزشک تعیین می کند . لذا دارو را طبق دستور پزشک مصرف نموده و درمان را تا مدت توصیه شده توسط پزشک ادامه دهید.

عوارض جانبی:

اختلالات قلبی و عروقی شامل ترومبوفلیت و آمبولی ریوی
گیجی، خستگی، بی خوابی، افسردگی، عصبی شدن
تحریک در محل تزریق
کاهش یا افزایش وزن و تهوع
واکنش های افزایش حساسیت مانند آنافیلاکسی یا آنژیوادم
آمنوره، خونریزی های نا منظم، ترشحات دهانه رحم، تغییر در جریان خون قاعدگی، ترشح شیر، راش جلدی، آکنه، ملاسما، ادم، احتباس مایعات و هیرسوتیسم، تغییرات در پستان و حساس شدن

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و داخل جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را از دسترس کودکان دور نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران-ایران

ابوریحان
شرکت داروسازی



Aburaihan
Pharmaceutical Co.