

آمپول متیل پردنیزولون استات ۴۰ میلی گرم

مشخصات دارو:

متیل پردنیزولون استات از دسته ی دارویی کورتیکواستروئید هاست که به صورت سوسپانسیون تزریقی موجود می باشد و در هر سی سی از آن، ۴۰ میلی گرم دارو می باشد.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. متیل پردنیزولون استات یک گلوکوکورتیکوئید دارای قدرت متوسط است. این دارو هیچگونه فعالیت مینرالوکورتیکوئیدی ندارد، ولی فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی آن زیاد و حدود ۵ برابر هیدروکورتیزون با وزن معادل است. این دارو عمدتاً بعنوان یک داروی ضد التهاب و سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می شود و در موارد شوک، آلرژی، درمان یا کم کردن نواقص حسی و حرکتی ایجاد شده بوسیله صدمه حاد نخاعی به عنوان داروی کمکی در درمان پنومونی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید. دوز متیل پردنیزولون استات براساس نوع بیماری، توسط پزشک شما تعیین می شود. دوز معمول این دارو برای بیماری های مختلف ، معمولاً ۸۰-۱۰ میلی گرم عضلانی، هر ۲-۱ هفته می باشد. برای تزریق داخل وریدی و داخل نخاعی نمی باشد. فقط برای تزریق عضلانی، داخل مفصل، داخل سینوویوم (غشا زلالی) ضایعه یا بافت نرم. تزریق متیل پردنیزولون می تواند در محل تزریق (درم و زیر درم)، تغییراتی مانند آتروفی ایجاد کند که جهت جلوگیری از این عارضه، از تزریق دارو بیش از مقدار توصیه شده در هر نوبت جلوگیری شود. در صورت امکان، مقدار داروی مورد نظر، در چند تزریق با حجم های کمتر در نقاط مختلف پوست انجام شود. در هنگام تزریق عضلانی و داخل سینوویوم، از نشست دارو به داخل درم جلوگیری شود. از تزریق در عضله دلتوئید، به علت احتمال بالای آتروفی زیر جلدی جلوگیری شود. در تزریق مفصلی (intra-articular)، دارو میتواند به صورت سیستمیک نیز جذب شود.

موارد منع مصرف:

در حساسیت مفرط به اجزای فرآورده های کورتیکواستروئید، عفونت قارچی سیستمیک، در نوزادان نارس، صدمات مغزی، تزریق وریدی و تزریق داخل فضای مغزی- نخاعی منع مصرف دارد.

هشدارها و احتیاطات:

استروئید ها از جمله متیل پردنیزولون استات می توانند باعث تضعیف سیستم ایمنی شوند. در صورت ابتلا به بیماری یا وجود هر گونه عفونت قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید. زخم گوارشی، بیماری کلیوی ، فشار خون بالا، پوکی استخوان، دیابت، اختلالات ترومبوآمبولیک، حملات تشنجی، میاستنی گراو، نارسایی قلبی، سل، کم کاری تیروئید، سیروز کبدی، بی ثباتی روانی، کولیت اولسراتیو، عفونت هرپس سیمپلکس چشمی این دارو می تواند موجب عوارض چشمی همچون گلوکوم و آب مروارید شود. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در بینایی، با پزشک خود مشورت کنید.

بارداری و شیردهی:

در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید. رده بندی FDA: رده C. مصرف آمپول متیل پردنیزولون استات در دوران بارداری تنها در صورتی مجاز است که مزیت این دارو نسبت به ریسک خطرات احتمالی آن برای جنین قابل توجه باشد. مصرف پردنیزولون در شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد زیرا می تواند در شیر مادر ترشح شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر، پزشک خود را آگاه سازید. این تداخلات می تواند شامل داروهای ذیل باشد: داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، واکسن ها، داروهای ضد تشنج (مانند باربیتورات ها، فنی توئین، کاربامازپین)، داروهای ضد سل (مانند ریفامپین، ایزونیاژید)، داروهای ضد هپاتیت C و ایدز (نویراپین، افاویرنز، ریتوناویر و نلفیناویر)، داروهای ضد قارچ (کتوکونازول، ایتراکونازول)، آنتی بیوتیک ها (مانند اریترومایسین)، داروهای ضد بارداری و استروژن ها و داروهای کاهنده قند خون و انسولین

عوارض جانبی:

مانند دارو های دیگر، متیل پردنیزولون استات می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند. عوارض جانبی شایع این دارو شامل: احساس سرخوشی، بی خوابی، سردرد، عصبانیت، بیقراری افزایش فشار خون، آریتمی، ایست قلبی کشنده و کلاپس گردش خون (به دنبال دوزهای بزرگ و تزریق وریدی سریع)، ترومبوآمبولی و ترومبوفلیت، تاخیر در بهبود زخم، آکنه، بثورات پوستی، هیرسوتیسم، آب مروارید، گلوکوم افزایش اشتها، تهوع، استفراغ، پانکراتیت، کاهش پتاسیم خون، افزایش قند خون، توقف رشد در کودکان، عدم تحمل کربوهیدرات، هیپوکالسمی، ضعف عضلانی - اسکلتی، استئوپروز، بی نظمی قاعدگی.

سایر عوارض:

بی کفایتی حاد غده فوق کلیوی ممکن است با افزایش استرس، عفونت، جراحی، ضربه یا قطع ناگهانی مصرف دارو بعد از مصرف طولانی مدت آن بروز کند، ابتلا به عفونتها، تاری دید و سرو رتینوپاتی مرکزی

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

مصرف کننده محترم ، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند ، بخش علمی شرکت ، با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ - ۰۲۱ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران - ایران

شرکت داروسازی
ابوریحان



Aburaihan
Pharmaceutical Co.