



شیاف دیکلوفناک ۵۰ میلی گرم

دسته دارویی:

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

نحوه عمل و فارماکوکینتیک:

این داروها دارای فعالیت ضدتب و تسکین دهنده درد و ضد التهاب می باشند. به نظر می رسد که مکانیزم اصلی اثر دارو بر پایه بازداري فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز و سنتز پروستاگلندین باشد.

پس از جذب دارو، تقریباً ۹۹ درصد آن به آلبومین پلاسما متصل می گردد. دیکلوفناک متابولیزه شده و از طریق ادرار و صفرا بصورت کونژوگه گلوکورانید و سولفات دفع می گردد.

موارد مصرف:

آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، اسپاندیلیت انکیلوزان، التهابات غیرروماتیسمی مانند صدمات ورزشی، بورسیت، کپسولیت، سینوویت، تاندینیت، دیسمنوره و غیره.

موارد منع مصرف:

• حساسیت به داروی دیکلوفناک

• در بیمارانی که پس از استفاده از آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی دچار آسم و یا سایر واکنشهای حساسیتی شده اند؛ در اینگونه بیماران ممکن است واکنشهای شبه آنافیلاکتیک شدید و ندرتاً مرگبار ایجاد گردد.

عوارض جانبی:

سردرد، سرگیجه، ادم، افزایش فشار خون، نارسایی قلبی، بثورات پوستی، کهیر،

حساسیت به نور، حساسیت تماسی، وزوز در گوش، اسهال، استفراغ، درد ناحیه شکم، اولسرپپتیک، نارسایی حاد کلیوی، کاهش هموگلوبین، تنگی نفس (در افراد حساس به آسپرین).

هشدارها و احتیاط های لازم:

- جهت مصرف دارو در دوران بارداری با پزشک مشورت نمائید.
- مصرف در دوران شیردهی معمولاً توصیه نمی شود.
- برای کودکان زیر ۶ سال توصیه نمی گردد.
- در افراد مسن بروز عوارض جانبی بیشتر است.
- در بیمارانی که دچار ناراحتی های کلیوی می باشند با احتیاط مصرف گردد.

میزان مصرف:

میزان مصرف هر دارو را پزشک مشخص می کند. (با پزشک خود مشورت نمائید).

نوع بسته بندی:

هر بسته حاوی ۱۰ عدد شیاف (درون فویل آلومینیوم).

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- دور از دسترس کودکان قرار داده شود.