

لوزارتان ۵۰،۲۵

قرص روکش دار لوزارتان ۲۵ و ۵۰ میلی گرم

دسته دارویی:

لوزارتان پتاسیم یک داروی کاهنده فشار خون از گروه داروهای آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II می باشد.

راهنمایی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو:

۱. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
۲. قبل از مصرف در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.
 - در صورت داشتن حساسیت به داروی لوزارتان پتاسیم
 - بارداری
 - در صورت ابتلا به اختلالات کلیوی یا کبدی
 - در صورت مصرف هر نوع دارو، چه با نسخه چه بی نسخه
 - ۳. مقدار دارو را بدون نظر پزشک تغییر نداده و از قطع ناگهانی دارو بدون اطلاع پزشک خودداری نمایید.
 - ۴. هر روز در یک ساعت معین دارو را میل نمایید.
 - ۵. این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا میل نمود.
 - ۶. اگر یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، چنانچه تا یک ساعت بعد به خاطر آوردید، آن را میل کنید، در غیر این صورت از خوردن آن صرف نظر کنید و نوبت بعدی را دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- ضد فشار خون بالا

بالغین:

- دوز اولیه: ۵۰ میلی گرم به صورت خوراکی یک بار در روز
- دوز نگهدارنده: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم به صورت خوراکی، یک بار در روز که ممکن است به صورت یک دوز واحد و یا به صورت دو دوز منقسم در روز مصرف گردد.

توجه:

۱. جهت بیمارانی که اختلال عملکرد کبدی داشته و یا بیمارانی که داروی دیورتیک مصرف می کنند دوز اولیه ۲۵ میلی گرم در روز می باشد.
۲. در صورت عدم کنترل علائم فشار خون به وسیله می توان یک دوز بسیار کم از دیورتیک را هم به رژیم درمان اضافه کرد.

درمان نفروپاتی دیابتیک:

دوز اولیه: ۵۰ میلی گرم به صورت خوراکی، یک بار در روز که بسته به میزان فشار خون می تواند تا ۱۰۰ میلی گرم در روز نیز افزایش یابد.

تداخلات دارویی:

- داروهای کاهنده فشار خون
- داروهای مدر (دیورتیک) به ویژه دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم
- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به ویژه ایندومتاسین
- لیتیم

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوره بارداری و شیردهی ممنوع است.

عوارض جانبی:

- عوارض شایع: سردرد
- سایر عوارض: خواب آلودگی، احساس خستگی، کمردرد، احتقان بینی، اسهال

هشدارها:

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و گیجی شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، بپرهیزید.
- حتی در صورت بهبود علائم بیماری، دارو را ادامه دهید و از قطع ناگهانی و خودسرانه آن بپرهیزید.
- از مصرف الکل در طول مدت درمان خودداری فرمایید.
- در صورت بروز اسهال، تهوع و استفراغ فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ - ۰۲۱ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران - ایران

شرکت داروسازی
ابوریحان



Aburaihan
Pharmaceutical Co.