

قرص دومپریدون ۱۰ میلی گرم

دسته دارویی:

ضد استفراغ، عامل بلوک کننده دوپامینرژیک.

موارد مصرف:

- دومپریدون در موارد زیر تجویز می شود:
- علایم ناشی از اختلالات حرکتی دستگاه گوارش فوقانی که منجر به التهابات گوارشی مزمن و تحت حاد می گردد.
- فلج خفیف گوارشی ناشی از دیابت.
- علایم گوارشی ناشی از مصرف برخی آگونیست های دوپامینی مورد استفاده در درمان بیماری پارکینسون.
- تهوع و استفراغ متعاقب شیمی درمانی و اعمال جراحی.
- میگرن.

توصیه به بیمار:

در صورت فراموش کردن یک دوز، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید مگر اینکه به زمان مصرف دوز بعدی نزدیک باشید که از دو برابر کردن دوز دارو پرهیزید. در صورت بروز ضعف، غش، سرگیجه، یا سایر علایم غیر طبیعی پزشک خود را مطلع سازید.

موارد منع مصرف:

- اختلالات کبدی.
- حساسیت به دومپریدون.

عوارض جانبی:

برافروختگی صورت، سردرد، خشکی دهان، واکنشهای اکستراپیرامیدال آیدو سینکراتیک، افزایش غلظت پرولاکتین سرم، کاهش میل جنسی. موارد هشدار و احتیاط:

- لزوم انجام توجهات پزشکی در صورت بروز ضعف، غش، سرگیجه یا سایر علایم غیر طبیعی.
- دومپریدون جهت درمان های مزمن یا پیشگیرانه تهوع و استفراغ توصیه نمی شود، زیرا این دارو احتمال ابتلا به نئوپلاسم پستان را افزایش می دهد.

مقدار مصرف دارو:

اختلالات حرکتی دستگاه گوارش:

یک قرص ۳-۴ بار در روز، ۱۵ الی ۳۰ دقیقه قبل از غذا و هنگام خواب (در صورت لزوم) تهوع و استفراغ بدنال مصرف آگونیست های دوپامینی در درمان پارکینسون: دو قرص ۳-۴ بار در روز

تداخلات دارویی:

آنتاگونیست های دوپامینی، بروموکریپتین، ضد دردهای مخدر، داروهای آنتی موسکارینی، داروهای ضد قارچ آزولی، مهار کننده HIV پروتئاز، آنتی های بیوتیک های ماکرولیدی، مهار کننده های مونوآمین اکسیداز، اشکال آهسته رهش یا انتریک کتد داروها.

مصرف در حاملگی و شیردهی:

در مورد این دارو مطالعات انسانی انجام نشده است. مطالعات بر روی حیوانات نیز هیچگونه اثر تراژیک یا امبریوتوکسیک نشان نداده است. دومپریدون به میزان کم در شیر ترشح می شود. بنابراین مصرف آن در مادران شیرده مگر در مواردی که منافع مصرف آن بر مضراتش ارجح باشد توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. جعبه ۳۰ عددی، هر جعبه حاوی ۳ بلیستر و هر بلیستر حاوی ۱۰ عدد قرص دومپریدون می باشد. جعبه ۶۰ عددی، هر جعبه حاوی ۶ بلیستر و هر بلیستر حاوی ۱۰ عدد قرص دومپریدون می باشد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم - شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان تهران - ایران

Domperidone

Tablet 10 mg

Category:

Anti emetic, dopaminergic blocking agent.

Indications:

Domperidone is indicated for treating:

Symptoms associated with upper gastrointestinal motility disorders caused by chronic and subacute gastritis.

- Diabetic gastroparesis.
- Gastrointestinal symptoms associated with the use of dopamine agonist anti-parkinsonian agents.
- Nausea and vomiting associated with chemotherapy or after operations.
- Migraine.

Patient Consultations:

Missed doses: Taking as soon as possible, not taking if almost time for next scheduled doses, not doubling doses. Contraindications:

- Hepatic impairment
- Sensitivity to domperidone

Precautions:

Obtaining medical attention is needed if fainting, dizziness or other unusual symptoms occur.

Domperidone is not recommended for chronic use or for the routine prophylaxis nausea and vomiting, because it increases mammary neoplasm.

Pregnancy / Breast feeding:

Human studies have not been done. Animal studies have not shown teratogenic or embryotoxic effects.

Low concentrations of domperidone are found in the breast milk, therefore, nursing is not recommended by mothers receiving domperidone unless the expected benefits outweigh any potential risk.

Side / Adverse effects:

Facial flushing, headache, slight somnolence, dry mouth, idiosyncratic extrapyramidal reactions plasma/prolactin concentration increase, reduction of libido.

Interactions:

Dopamine antagonist, bromocriptine (hypoprolactinemic effect), opioid analgesics and antimuscarinics.azole antifungals, HIV protease inhibitors, macrolide antibiotics, mono amine oxidase inhibitors, sustained-release or enteric-coated formulations of drugs.

Dosage and Administration:

Gastrointestinal motility disorders: One tablet (10mg base) 3 to 4 times a day 15 to 30 minutes before meals and at bedtime, if required.

Nausea and vomiting associated with dopamine agonist antiparkinsonian agents: 2 tablets (20mg base) 3 to 4 times a day.

Storage / Strength (s) and Packaging:

Store below 30°C, in a tight container. Protect from light and moisture.

- 10 Tablets are packed in one blister and 3 blisters with one leaflet are inserted in a cardboard box.
- 10 tablets are packed in one blister and 6 blisters with one leaflet are inserted in a cardboard box.

Manufactured by Aburaihan Pharmaceutical Co. Tehran-IRAN.

