

قرص روکشدار رابزول®

با آزاد سازی تاخیری (رابرازول سدیم)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی:

- ۱- قبل از مصرف این دارو و در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.
 - در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.
 - در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً دیگوکسین، داروهایی که جذب آنها بستگی به میزان ترشح اسید معده دارد.
 - در صورت ابتلا به سایر بیماریها خصوصاً بیماریهای کبدی.
 - در صورت نیاز به انجام تست های آزمایشگاهی.
- ۲- قرص های رابزول® را بایستی به صورت دست نخورده و کامل مصرف کرد. قرص ها را نباید جوید، خراش داد یا شکست.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد: درمان رفلاکس معده ای- روده ای : یک عدد قرص رابزول® در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته استفاده شود. چنانچه پس از ۸ هفته بهبودی حاصل نشد می توان دوره درمان را به مدت ۸ هفته دیگر ادامه داد. درمان زخم دئودنوم : دوز توصیه شده یک عدد قرص در روز بعد از صبحانه به مدت ۴ هفته می باشد. رژیم درمانی هلیکوباکتریلوری: قرص رابزول® (۲۰ میلی گرم دو بار در روز)، کلاریترومایسین (۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز) و مترونیدازول (۴۰۰ میلی گرم دو بار در روز) و یا آموکسی سیلین (یک گرم دو بار در روز) درمان سندروم زولینگر-الیسون : دوز توصیه شده رابزول® در این افراد ۶۰ میلی گرم یکبار در روز می باشد.

این دوز بایستی در هر فرد به صورت جداگانه تنظیم شود. دوزهای تا ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز و ۶۰ میلی گرم دو بار در روز نیز تجویز شده است. دوره درمان را می توان تا یکسال ادامه داد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری باید با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضرات مصرف آن باشد. این کار باید حتماً با تشخیص و نظر پزشک متخصص انجام شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی با توجه به ترشح آن در شیر بایستی با قطع شیردهی همراه باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید:

شیوع کمتر: آبنه، اختلالات خونی، تشنج، خون در ادرار (هماچوری)، هپاتیت.

شیوع زیاد: سردرد

شیوع نادر: بیوست، احساس ضعف، گیجی، سوء هاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ، گزگز دست و پا، خارش، خواب آلودگی و درد شکم.

هشدارها:

در صورت نیاز به انجام تست های آزمایشگاهی پزشک خود را، از مصرف دارو آگاه کنید. در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو بلافاصله با پزشک تماس گرفته و یا بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل کنید. قرص را به طور کامل و دست نخورده مصرف کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً دیگوکسین، کتوکونازول، سیکلوسپورین موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از رطوبت، درون بسته بندی ارائه شده نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

این دارو به صورت قرص های روکشدار با آزادسازی تاخیری حاوی ۲۰ میلی گرم ماده موثره رابرازول سدیم توسط شرکت داروسازی ابوریحان تولید می شود. قرص ها به رنگ زرد بوده و ۳۰ عدد قرص درون قوطی به همراه یک بروشور درون جعبه قرار می گیرند.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند بخش علمی شرکت، با شماره ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

