

رالوفن®

قرص رالوکسیفن هیدروکلراید ۶۰ میلی گرم

مشخصات دارو:

هر قرص حاوی ۶۰ میلی گرم رالوکسیفن هیدروکلراید می باشد.

دسته دارویی:

تنظیم کننده اختصاصی گیرنده های استروژنی، پیشگیری کننده از پوکی استخوان

موارد مصرف:

پوکی استخوان، پیشگیری و درمان استخوان پس از بروز یائسگی

موارد منع مصرف:

کلستاز، سرطان آندومتری، ترومبوآمبولی وریدی (فعال یا دارای سابقه)، خونریزی رحمی تشخیص داده نشده

بارداری و شیردهی:

رده بارداری X: مصرف این دارو در کسانی قصد بارداری دارند، زنان باردار و مادران شیرده ممنوع می باشد.

هشدارها و احتیاطات:

- ترومبوآمبولی وریدی: افزایش خطر ترومبوز ورید عمقی، آمبولی ریه و ترومبوز سیاهرگ شبکه. ۷۲ ساعت قبل و در طول بی-حرکتی طولانی مدت مصرف را قطع کنید.
- در طول درمان سرطان سینه، در زنان قبل از یائسگی و در صورت مصرف همزمان با استروژن های سیستمیک، مصرف این دارو توصیه نمی شود.
- در بیماری های قلبی عروقی، نارسایی کبدی، افراد دارای ریسک خطر سکته مغزی و ترومبوآمبولی وریدی با احتیاط مصرف شود.
- هیپرتری گلیسیریدمی: اگر درمان قلبی با استروژن منجر به هیپرتری گلیسیریدمی شد، تری گلیسیرید سرم را کنترل کنید.
- در پورفیری های حاد اجتناب شود.

تداخلات دارویی:

کلستیرامین، وارفارین، داروهای با پیوند با پروتئین بالا شامل دیازپام، دیازوکسید و لیدوکائین، ایروپروفن و ناپروکسن

مقدار و نحوه مصرف دارو:

قرص ۶۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز

عوارض جانبی:

بسیار شایع و شایع (>۱/۱۰): سندرم شبه آنفولانزا، گرفتگی عضلات پا، گرگرفتگی، ادم محیطی، آمبولی و ترومبوز، ناهنجاری های سینه، ناراحتی دستگاه گوارش و اختلال گوارشی، حالت تهوع، سردرد، افزایش فشار خون و راش پوستی
غیر شایع (<۱/۱۰، ≥۱/۱۰۰): عوارض ترومبوآمبولیک وریدی، ترومبوسیتوپنی، سکته مغزی

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت، درون بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم - شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.
شرکت داروسازی ابوریحان تهران-ایران



Ralofen[®]

Raloxifene hydrochloride 60 mg tablets

Description:

Each tablet contains 60 mg of raloxifene hydrochloride.

Category:

Selective estrogen receptors modulator, Osteoporosis prophylactic

Indications:

Osteoporosis, Prophylaxis and treatment of osteoporosis postmenopausal

Contraindication:

Cholestasis, endometrial cancer, (active or history of) venous thromboembolism, undiagnosed uterine bleeding

Pregnancy and Breastfeeding:

Pregnancy category X: The use of this drug is prohibited in those who intend to become pregnant, pregnant women and nursing mothers.

Warning and Precaution:

- Venous thromboembolism: increased risk of deep vein thrombosis, pulmonary embolism and retinal vein thrombosis. Stop taking 72 hours before and during prolonged immobility.
- During the treatment of breast cancer, in premenopausal women and in case of simultaneous use with systemic estrogens, the use of this drug is not recommended.
- Use with caution in cardiovascular diseases, liver failure, people at risk of stroke and venous thromboembolism.
- Hypertriglyceridemia: If previous estrogen therapy resulted in hypertriglyceridemia, monitor serum triglycerides.
- Avoid in acute porphyries.

Drug interactions:

cholestyramine, warfarin, high protein binding drugs including diazepam, diazoxide and lidocaine, ibuprofen and naproxen

Dosage and Administration:

Oral, 60 mg tablet once a day

Side effects:

- Very common and common (<0.1): flu-like syndrome, leg cramps, hot flushes, peripheral edema, embolism and thrombosis, chest abnormalities, digestive system discomfort and digestive disorder, nausea, headache, increased blood pressure and skin rash.
- Uncommon (<0.01, ≤0.001): venous thromboembolic complications, thrombocytopenia, stroke

Storage:

Store below 30°C, Keep in original packaging and protect from light and moisture.

Keep out of the reach of children.



Manufactured by **Aburaihan** Pharma.Co.
Tehran-Iran