

قرص دگزامتازون ۴ میلی گرمی

هر قرص خط دار دگزامتازون ۴ میلی گرم حاوی ۴ میلی گرم دگزامتازون به عنوان ماده ی موثره می باشد.

بسته بندی:

بلیستر ها حاوی ۱۰ قرص و هر ۱۰ بلیستر در یک جعبه بسته بندی می شوند.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ی آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

دگزامتازون یک گلوکوکورتیکوئید سنتتیک است. گلوکوکورتیکوئید ها توسط بخش قشری غده فوق کلیه ترشح می شوند. این دارو دارای اثرات ضد التهابی، ضد درد و ضد آلرژی می باشد و در دوز های بالا سیستم ایمنی را سرکوب می کند.

دگزامتازون در درمان بیماری های خود ایمنی و روماتوئیدی (مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک، آرتریت روماتوئید و...)، بیماری های تنفسی، بیماری های پوست و بافت پیوندی، بیماری های مربوط به سیستم عصبی مرکزی، بیماری های کلیوی، درمان علامتی نئوپلازی و اختلالات خونی، حالات ادماتوز، بیماری های گوارشی، بیماری های چشمی و اختلالات غدد، مورد مصرف قرار می گیرد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود مشکلات زیر، قبل از مصرف قرص دگزامتازون پزشک خود را مطلع سازید:

حساسیت به دگزامتازون، وجود عفونت های سیستمیک، مگر اینکه تحت درمان با داروهای آنتی بیوتیک باشید، وجود زخم های معده یا روده، واکسیناسیون با واکسن های زنده در زمان درمان با دوز های درمانی بالای دگزامتازون (زیرا دوز های بالای گلوکوکورتیکوئید ها باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود)، نارسایی غده ی آدرنال، وجود تومور غده ی آدرنال (فئوکروموسایتوما)، فشار خون بالا و بیماری های قلبی، دیابت یا سابقه ی دیابت در خانواده، پوکی استخوان (به ویژه در خانم های یائسه)، گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم) و آب مروارید و یا وجود سابقه ی خانوادگی، وجود میاستنی گراویس، وجود اختلالات یا زخم های گوارشی، بیماری های روانی که

با داروهای مشابه وخیم تر شده اند، ابتلا به عفونت های باکتریایی، قارچی و ویروسی، واکسیناسیون با واکسن های زنده، در صورت وجود میگرن، مصرف کورتیکواستروئید می توانند منجر به ایجاد گلوکوم و آب مروارید شود، لذا در صورت مشاهده تغییر در بینایی در حین استفاده از این دارو، با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت نیاز به قطع کورتیکوئید ها از جمله دگزامتازون به تدریج کاهش دوز داده شوند.

سالمندان

در سالمندان برخی از عوارض این دارو می تواند جدی تر باشد مانند پوکی استخوان، افزایش فشار خون، کاهش پتاسیم خون، دیابت و ابتلا به عفونت ها، بنابراین پزشک شما را در فواصل کمتری مانیتور خواهد کرد.

کودکان

در کودکان مانیتور کردن رشد و نمو در فواصل زمانی منظم، بسیار با اهمیت است.

بارداری و شیردهی:

اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

دگزامتازون دارای رده بندی C در بارداری است. اطلاعاتی در مورد مصرف دگزامتازون در بارداری در دسترس نیست. در صورتی که گزینه ی دیگری در دوران بارداری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن سود و مضرات دارو برای مادر و جنین می تواند مصرف شود. در مورد ترشح دگزامتازون در شیر مادر اطلاعات زیادی در دسترس نیست. تصمیم گیری برای قطع دارو یا شیردهی باید با توجه به ارزیابی پزشک شما صورت گیرد.

قرص های دگزامتازون حاوی لاکتوز (یک نوع قند) می باشد. در صورتی که عدم تحمل برخی قندها برای شما تشخیص داده شده است، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید. در صورتی که احساس گنجی، توهم، خستگی یا خواب آلودگی می کنید از رانندگی یا استفاده از ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند بپرهیزید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر داروی دیگری به پزشک خود اطلاع دهید.

دگزامتازون می تواند با داروهای زیر تداخل داشته باشد:

- داروهای ضد انعقاد (نظیر وارفارین) • داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (نظیر بروفن، ایندومتاسین و...) • داروهای پایین آورنده ی قند و فشار خون • داروهای که در درمان بیماری های قلبی مورد مصرف قرار می گیرند • داروهای مدر • آمفوتریسین ب • داروهای ضد صرع مانند کاربامازپین، پریمیدون، فنی توئین • داروهای ضد سل (ایزونیازید، ریفامپین) • آنتی اسید ها (به خصوص آنتی اسید های حاوی منیزیم تری سالیسیلات) • استازولاماید (در درمان گلوکوم) • مصرف همزمان کورتیکواستروئید های دیگر
- کتوکونازول، ایتراکونازول در درمان عفونت های قارچی • ریتوناویر (در درمان ایدز) • آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین و فلوروکینولون ها • کلستیرامین • قرص های ضد بارداری خوراکی • تتراکازاکتاید در تست عملکرد آدرنوکورتیکال • سیکلوسپورین • واکسن های زنده • کلروکین و هیدروکسی کلروکین

دوز مصرف دارو:

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.

دگزامتازون در دوزهای معمول ۵، ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم روزانه و با توجه به نوع بیماری تجویز می شود.

در بیماری ها با شرایط حاد ممکن است دوز های بیش از ۱۵ میلی گرم نیاز باشد.

دوز دارو باید بر اساس نوع بیمار و بیماری تنظیم شود. برای کاهش عوارض جانبی باید کمترین دوز مورد نیاز تجویز شود.

اگر قرص دگزامتازون را بیش از آنچه لازم است مصرف نمودید، بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

اگر دوز دگزامتازون خود را فراموش کردی، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید، مگر آنکه زمان مصرف دوز بعدی دارو نزدیک باشد. در صورت فراموشی هیچ گاه دوز داروی خود را، در نوبت بعدی مصرف، دو برابر نکنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب دارای عوارض جانبی نیز می باشد. عوارض جانبی با دوز، زمان تجویز و طول دوره ی درمان مرتبط است. در صورتی که طول دوره ی درمان کوتاه باشد و بیمار توسط پزشک تحت کنترل قرار گیرد ریسک عوارض جانبی کمتر است.


عوارض جانبی شایع در درمان کوتاه مدت با دگزامتازون شامل افزایش وزن، اختلالات روانی، عدم تحمل گلوکوز و نارسایی غده ی آدرنال است. عوارض جانبی در استفاده ی طولانی مدت دگزامتازون (ماه تا سال) معمولاً باعث چاقی مرکزی، شکننده شدن پوست، آتروفی عضلات، پوکی استخوان، تاخیر در رشد و نارسایی طولانی مدت غده ی آدرنال، تاری دید و سرور رتینوپاتی مرکزی می شود.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.





قرص دگزامتازون ۰/۵ میلی گرمی

دسته دارویی:

ضد التهاب استروئیدی

ترکیب:

این دارو حاوی ۰/۵ میلی گرم دگزامتازون می باشد.

فارماکوکینتیک و مکانیسم اثر:

- گلوکوکورتیکوئیدها، استروئیدهای آدرنوکورتیکال هستند که به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شوند.

نیمه عمر آنها در پلازما ۱۹۰ دقیقه است و ۷۷٪ به پروتئین های پلازما متصل می گردد. دفع این دارو از بدن ۶۵٪ از طریق ادرار است.

- گلوکوکورتیکوئیدها پاسخ سیستم ایمنی بدن را به محرکها کاهش می دهند. دگزامتازون یکی از آنالوگهای گلوکوکورتیکوئیدها می باشد که دارای اثرات ضد التهابی در بسیاری از اندام های بدن است.

موارد مصرف:

- حالت آلرژی، بیماریهای پوستی، اختلالات غدد، اختلالات گوارشی، اختلالات کلیوی، اختلالات تنفسی بیماریهای روماتوئید.

موارد منع مصرف:

- در صورت ابتلا به عفونتهای قارچی از مصرف دارو خودداری کنید.

موارد احتیاط:

در صورت وجود هر یک از مشکلات زیر، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- حساسیت به کورتیکواستروئیدها

- اختلالات قلبی و کلیوی

- عفونت (قارچی، باکتریایی، ویروسی)، ابتلا به سل

- مصرف کورتیکواستروئید می تواند منجر به ایجاد گلوکوم و آب مروارید شود. لذا در صورت مشاهده تغییر در بینایی در حین استفاده از این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

واکسیناسیون: تزریق واکسن زنده یا زنده ضعیف شده در بیمارانی که کورتیکواستروئیدها را با دوزهای تضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند ممنوع است. تجویز واکسن مرده یا غیر فعال ممکن است صورت گیرد، ولی واکنش به چنین واکسن هایی را نمی توان پیش بینی نمود.

راهنمایی های عمومی جهت مصرف دارو:

- کاهش دوز دارو باید به صورت تدریجی باشد.

- مصرف در حاملگی:

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه C می باشد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر، پزشک خود را مطلع نمایید. آمفوتریسین B (تزریقی)، مشتقات پتاسیم، آمینوگلوکوتیماید، آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی، آنتی کولین استراژها، ضدانعقادهای خوراکی، داروهای ضد دیابت، داروهای ضد سل، کنتراسپتیوهای خوراکی و ترکیبات استروژن گلیکوزیدهای دیجیتالی، سیکلوسپورین، کلستیرامین، افرین، کتوکونازول و فنی توئین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی دارای عوارض جانبی نیز می باشد. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر پس از مصرف دارو پزشک خود را مطلع نمایید.

پوکی استخوان، واکنشهای آلرژیک، احتباس آب و الکترولیت، ادم، هیرسوتیسم، آکنه، تغییر آنزیم های کبدی، تهوع، التهاب لوزالمعده، بلع دردناک، سردرد، ورم ریوی، زخم دستگاه گوارش با خونریزی، تکثیر سلول های روده هایپرگلاسیمی، برادی کاردی، افزایش فشار خون، بزرگی کبد، تاری دید و سرورزینیو باتی مرکزی.

دوز مصرف دارو:

دوز مصرف دارو ۰/۷۵ تا ۰/۹ میلی گرم در روز می باشد که بستگی به نوع بیماری دارد. دوز مصرف باید تغییر داده شود و باید براساس نوع بیماری و پاسخ بیمار به داروتنظیم گردد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و درون جعبه نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

نوع بسته بندی:

یک جعبه شامل ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی

