

قرص جویدنی مونتکس ۵ میلی گرم (مونته لوکاست)

قرص روکشدار مونتکس ۱۰ میلی گرم

یادآوری:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

دوره درمان را کامل کنید.

مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.

چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، با پزشک یا دارو ساز خویش تماس بگیرید.

ترکیب:

هر قرص جویدنی مونتکس ۵ حاوی ۵ میلی گرم مونته لوکاست سدیم.

هر قرص روکشدار مونتکس ۱۰ حاوی ۱۰ میلی گرم مونته لوکاست سدیم.

راهنمایی عمومی:

لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای هر یک از شرایط زیر می باشد، پزشک خویش را مطلع سازد.

سابقه حساسیت به این دارو.

سابقه اختلالات عملکرد کبدی.

مصرف در بارداری:

انجمن غذا و دارو ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزء گروه (B) قرار داده است. مصرف این دارو تنها با نظر پزشک در بارداری مجاز است.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد، منافع و مضار احتمالی ناشی از استفاده این دارو در دوران شیردهی باید در نظر گرفته شود.

موارد هشدار و احتیاط:

هشدار مهم:

امکان ایجاد وقایع عصبی و روانی جدی (به عنوان مثال رفتار و تغییرات روحی و روانی) در بزرگسالان، نوجوانان و کودکان تحت درمان با داروی مونته لوکاست گزارش شده است. اگر هنگام مصرف دارو، چنین علائمی را مشاهده کردید باید با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف این دارو در بیمارانی که اختلالات شدید عملکرد کبدی دارند باید با احتیاط همراه باشد.

نباید از این دارو به طور ناگهانی به عنوان جایگزین داروهای استنشاقی و یا خوراکی کورتیکو استروئیدی استفاده کرد.

از این دارو نمی توان به عنوان درمان منحصر در بیمارانی که پس از فعالیت دچار حملات آسمی می شوند استفاده نمود، بلکه این بیماران باید برای جلوگیری از بدتر شدن بیماری خود به مصرف رژیم های درمانی معمول خود شامل بتا آگونیست ها استنشاقی و یا خوراکی ادامه دهند.

توصیه میشود بیمارانی که سابقه حساسیت به و سایر می باشند علی رغم بهبود تنفسی خود پس از مصرف مونتکس همچنان از مصرف این دارو ها اجتناب نمایند. از آنجایی که قرص جویدنی مونتکس ۵ حاوی فنیل آلانین می باشد، مصرف این دارو در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری باید با احتیاط همراه باشد. همچنین مصرف همزمان این دارو با برخی از دارو ها دارای تداخل دارویی می باشد. لذا چنانچه از دارو های زیر استفاده میکنید پزشک خود را مطلع سازید.

مصرف همزمان این دارو با فئوباربیتال و ریفامپین (به علت افزایش متابولیسم کبدی مونته لوکاست) دارای تداخل دارویی می باشد.

مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمون عملکرد کبدی و اتوزینوفیل ها میگردد. به استثناء موارد خاص که پزشکتان لازم می داند، این دارو در موارد زیر منع استعمال دارد:

حساسیت به مونته لوکاست و یا هر یک از اجزاء متشکله توجه: از این دارو نباید جهت درمان فوری علائم حملات حاد آسمی استفاده نمود. به این بیماران توصیه میشود داروهای استنشاقی ضروری برای کنترل این حملات را همیشه در دسترس داشته باشند.

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو را دقیقاً مطابق شیوه ای که پزشکتان داده استفاده نمایید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین

میکند. ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونتکس ۵ برای پیشگیری و درمان بیماران آسم مزمن برای افراد ۶ تا ۱۵ سال بصورت تک دوز ابتدای شب و برای بهبود علائم رینیت آلرژیک ۵ میلی گرم تک دوز تجویز میشود.

برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن در بزرگسالان، قرص ۱۰ میلی گرمی مونتکس ۵ بصورت تک دوز ابتدای شب، و برای بهبود علائم رینیت آلرژیک ۱۰ میلی گرم تک دوز توصیه می شود. برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن در کودکان ۲ تا ۵ سال قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونتکس ۵ بصورت تک دوز ابتدای شب برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن در کودکان ۱۲ تا ۳۲ ماه قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونتکس ۵ بصورت تک دوز.

توجه: سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو برای پیشگیری و درمان آسم در کودکان زیر ۱۲ ماه و برای بهبود علائم رینیت آلرژیک در کودکان زیر ۶ ماه ثابت نشده است. در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه نمایید:

هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز ننمایید. این دارو را می توان با معده خالی یا همراه با غذا مصرف نمود.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خود داری نمایید.

عوارض جانبی:

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند، اگرچه همیشه تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا دارو ساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از:

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند.

شیوع کم: افزایش بدون علامت آنزیم های عملکرد کبدی نادر: وجود عفونت در ادرار

عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند: شایع: سردرد

شیوع کم: درد های شکمی، احساس کوفتگی، سرفه، دندان درد، اختلال در تعادل، سوء هاضمه، تب، التهاب معده و روده، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، گرفتگی بینی، علائم شبیه آنفولانزا، راش پوستی، بی قراری، واکنش های حساسیتی، (ورم صورت، لب ها، زبان و گلو)، کهیر و خارش، کابوس های شبانه، کبودی، اسهال، خواب آلودگی، توهم، هپاتیت، التهاب پانکراس، زود رنجی، درد مفاصل و ماهیچه ها، تهوع و استفراغ، تپش قلب، احساس کرختی و سوزن سوزن شدن پاها و دست ها، تشنج و اختلال در خواب عوارض جانبی بسیار نادر: تغییرات رفتاری و خلقی، علائم و سواس فکری، لکنت زبان

مسمومیت با دوز های بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل نمایید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

از مصرف دارو های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

