

کپسول ژینکس (پره گابالین)

کپسول های ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۲۵ و ۳۰۰ میلی گرمی

دسته دارویی:

ضد صرع

موارد مصرف:

- درمان کمکی صرع پارشیال (همراه یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه)
- درمان anxiety disorder ژنرالیزه
- درمان دردهای نوروپاتیک
- درمان صدمات طناب نخاعی
- درمان فیبرومیالژیا
- درمان درد متعاقب جراحی

موارد منع مصرف:

- حساسیت به پره گابالین
- قطع دارو باید با آهستگی و طبق نظر پزشک انجام شود.
- در صورت داشتن مشکل گوارشی دارو را بعد از غذا مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

- بسیار شایع: سرگیجه و خواب آلودگی
- شایع: اختلالات بینایی مانند دوبینی، آتاکسی، دیس آرتریا، لرزش، لتارژی، اختلال حافظه، سرخوشی، یبوست، خشکی دهان، ادم محیطی، کاهش یا از بین رفتن میل جنسی، اختلال نعوظ، افزایش وزن
- غیر شایع: دپرسیون، گیجی، آشفته گی، توهم، کرامپ عضلات، کاهش شدید یا ازدیاد حساسیت، تاکی کاردی، افزایش بزاق، تعرق، گرگرفتگی، راش، میالژی، آرترالژی، بی اختیاری ادرار، دفع ادرار دردناک، ترومبوسیتوپنی، تشکیل سنگ کلیه
- نادر: نوتروپنی، بلوک قلبی درجه ۱، هیپوتانسیون، هیپرتانسیون، پانکراتیت، اختلال بلع، اولیگوری، رابدومیولیز، خودکشی

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

ژینکس بصورت خوراکی، روزانه در ۲-۳ دوز منقسم تجویز می گردد. دوز اولیه در درمان epilepsy، روزانه ۱۵۰ میلی گرم است که بر اساس پاسخگویی بیمار به دارو پس از طی هفته اول به ۳۰۰ میلی گرم در روز و پس از طی هفته دوم به ۶۰۰ میلی گرم در روز قابل افزایش است. دوز اولیه دارو در درمان generalised anxiety disorder، برابر ۱۵۰ میلی گرم روزانه است که به میزان ۱۵۰ میلی گرم در فواصل یک هفته ای تا حداکثر ۶۰۰ میلی گرم در روز قابل افزایش است. دوز اولیه در درمان neuropathic pain در انگلستان روزانه ۱۵۰ میلی گرم است که بر اساس پاسخگویی بیمار به دارو پس از طی هفته اول به ۳۰۰ میلی گرم در روز و پس از طی هفته دوم به ۶۰۰ میلی گرم در روز قابل افزایش است. همین دوز در آمریکا در درمان neuropathic pain بیماران دیابتی (حداکثر تا ۳۰۰ میلی گرم) و postherpetic neuralgia مورد تایید است. قطع این دارو باید با کاهش تدریجی دوز در فواصل حداقل یک هفته ای صورت گیرد.

دوز در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه:

دوز ژینکس باید در این بیماران بر اساس میزان کلیترانس کراتینین CC کاهش یابد.

- CC ۳۰ تا ۶۰ میلی لیتر در دقیقه: دوز اولیه ۷۵ میلی گرم؛ ماکزیمم دوز روزانه ۳۰۰ میلی گرم در ۲-۳ دوز منقسم
- CC کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه: دوز اولیه ۲۵-۵۰ میلی گرم؛ ماکزیمم دوز روزانه ۱۵۰ میلی گرم

در ۱-۲ دوز

- بیماران تحت همودیالیز باید علاوه بر دوز روزانه، ۱۰۰-۲۵۰ میلی گرم از دارو را به عنوان دوز تکمیلی بلافاصله پس از طی هر جلسه ۴ ساعته دیالیز دریافت نمایند.

کودکان:

دوز دارو در این گروه تعیین نشده است.

تداخل های دارویی:

در مصرف همزمان با:

اپیوئیدها، بنزودیازپین ها، باربیتورات ها، اتانل و سایر داروهای سرکوب کننده سیستم اعصاب مرکزی

مصرف در حاملگی و شیردهی:

مصرف کنندگان این دارو باید در صورت باردار شدن یا تصمیم به بارداری و همچنین در زمان شیردهی، پزشک معالج خود را مطلع سازند.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
هر ۱۰ عدد کپسول ژینکس® (پره گابالین) (با هریک از دوز ها) در یک بلیستر و هر ۳ بلیستر همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

مصرف کننده محترم از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم، شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

