

آکنالین® ۰/۱ درصد

آداپالن کرم و ژل موضعی

ترکیب:

هر یکصد گرم حاوی ۰/۱ گرم آداپالن می باشد.

موارد مصرف:

آکنالین® برای درمان آکنه معمولی به کار برده می شود و در درمانهای آکنه خفیف تا شدید مؤثر است. آکنالین® جزء دسته رتینوئید ها است و توسط خاصیت رشد سلولها و کاهش تورم و التهاب عمل می کند.

مقدار مصرف:

یک لایه نازک از دارو را یکبار در روز بر روی پوست تمیز و خشک یک ساعت قبل از خوابیدن بمالید.

شروع اثر:

پاسخ های بالینی ممکن است در ۱ تا ۲ هفته نمایان شود، ولی پاسخ مناسب بعد از ۸ تا ۱۲ هفته دیده شده است.

بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و کنترل شده در افراد انجام نشده است. اگر چه مشکلاتی با آکنالین® موضعی استفاده شده برای آکنه گزارش نشده است، توصیه شده است که خانمهای باردار از آکنالین® استفاده نکنند. مشخص نیست که آداپالن در شیر پخش می شود یا خیر.

کودکان و میانسالان:

اطلاعاتی در مورد ارتباط بین سن و اثرات آکنالین® در دست نمی باشد.

تداخلات دارویی:

محصولات لایه بردار، آنتی بیوتیک های موضعی (نظیر کلیندامایسین) ، بنزوئیل پراکساید ، رزورسینول، سالیسیلیک اسید و سولفور اگر تصادفاً با آکنالین® استفاده شوند ممکن است سبب سوزش و خشکی پوست یا حساسیت به نور خورشید شوند، اگر این اثرات اتفاق افتاده ، استفاده از آکنالین® باید متوقف شود تا زمانی که سوزش پوست فروکش کند.

هشدارها:

از این دارو در زمان آفتاب سوختگی پوست یا زخمهای عمیق استفاده نکنید. از تماس با چشم، لب ها و درون دهان و سایر بافتهای مخاطی جلوگیری کنید. در طول مصرف این دارو، قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید و یا لامپهای خورشیدی را به حداقل برسانید (در صورتیکه قرار گرفتن در آفتاب اجتناب ناپذیر می باشد از محصولات ضد آفتاب و لباسهای محافظت کننده بر مناطقی از پوست که تحت درمان می باشد استفاده نمایید). از قرار دادن مناطق تحت درمان در معرض باد یا هوای سرد دوری کنید. از مصرف همزمان آن با سایر محصولات پوستی که می توانند باعث سوزش در پوست گردند (برای مثال محصولات دارویی یا صابونها و پاک کننده های سوزش آور، صابون ها و مواد آرایشی با اثر خشک کنندگی زیاد ، فرآورده های پوستی با غلظت بالای الکل ،مواد قابض و عصاره لیمو ترش) اجتناب نمایید.

از مصرف همزمان دارو با فرآورده هایی نظیر کلیندامایسین که برای درمان آکنه بکار می رود و یا فرآورده های پوستی لایه بردار که در ترکیب آنها از موادی مانند بنزوئیل پروکساید ، رزورسینول، سالیسیلیک اسید و یا گوگرد استفاده شده است اجتناب نمایید . (اگر از این محصولات استفاده می نمایید تا اتمام اثر این داروها در پوست ، درمان با آکنالین® را شروع نکنید). فرمزی پوست بین ۴ هفته اول استفاده عادی به نظر می رسد و معمولاً در طی زمان کاهش پیدا می کند.

در ۲۰٪ بیماران سوزش زودگذر و خارش پوست در هنگام استفاده از آکنالین® گزارش شده است. اگر سوزش پوست و کشیدگی پوست بیش از حد بود با پزشک خود مشورت کنید، استفاده از مرطوب کننده ها ، کرم ها یا لوسیون ها، برای کاهش سوزش و خشکی پوست مناسب است.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سؤالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان

تهران-ایران

ابوریحان
شرکت داروسازی



Aburaihan
Pharmaceutical Co.