

برندوکر®

قرص مجسترول ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

دسته دارویی:

مشتقات پروژسترون با خواص ضد نئوپلاسم

موارد مصرف:

- درمان کاشکسی
- درمان آنورکسی
- درمان کاهش وزن (معمولا همراه سرطان)
- درمان کارسینومای سینه
- درمان کارسینومای اندومتریم
- درمان کارسینومای پروستات
- پیشگیری از بروز هیپرپلازی اندومتریم ناشی از استروژن

موارد منع مصرف:

حساسیت به بادام زمینی، بدخیمی تومور سینه، بیماریهای حاد کبد مانند تومور بدخیم کبد، ازدیاد حساسیت به پروژستین ها، بارداری، ترومبوفلیت فعال یا ترومبوآمبولیک، خونریزی بدون تشخیص مجاری ادرار، رحم یا سایر ارگانهای تناسلی

لزوم برآورد فواید و مضرات تجویز دارو در موارد زیر:

آسم، نارسایی عملکرد قلب، صرع، هیپرتانسیون، سردردهای میگرنی، نقصان عملکرد کلیه، سابقه ابتلاء به اختلالات سیستم اعصاب مرکزی مانند افسردگی و تشنج، دیابت ملیتوس، سابقه ابتلاء به بیماریهای کبدی یا نقصان عملکرد کبد، هیپرلیپیدمی، احتمال ابتلاء به کمبود مواد معدنی در استخوانها، سابقه ابتلاء به بیماری ترومبوآمبولیک شامل بیماری عروق مغزی، آمبولی ریه، ترومبوز ششکبه و سابقه ابتلاء به ترومبوفلیت

عوارض جانبی:

- عوارض نیازمند به توجهات پزشکی:
- آمنوره، خونریزی های قاعدگی منقطع یا مترومنورژی، هیپرگلیسمی، لکه بینی، گالاکتوره، افسردگی، راش پوستی، سرکوب یا عدم کفایت عملکرد فوق کلیه یا بروز افت فشار خون، سندروم کوشینگ، ترومبوآمبولیسم یا شکل گیری ترومبوز
- عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن:
- کرامپ یا درد شکم، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، ادم، احساس خستگی، سردرد، تغییرات رفتاری، تهوع، عصبانیت، بزرگ شدن تخمدان ها یا تشکیل کیست تخمدان، ضعف، افزایش سریع و غیر معمول وزن، استفراغ، آکنه، ایجاد درد و سفتی در سینه، گرگرفتگی، بیخوابی، کاهش میل جنسی، کاهش یا افزایش رویش موی بدن و سرو صورت، ملاسما
- عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت بروز آنها بعد از قطع درمان:
- سرکوب یا عدم کفایت عملکرد فوق کلیه یا بروز افت فشار خون، تاخیر بازگشت زنان به باروری

مقدار مصرف دارو:

- بزرگسالان
- آنورکسی، کاشکسی یا کاهش وزن در بیمار مبتلاء به سرطان: روزانه ۸۰۰-۴۰۰ میلی گرم در یک دوز
- کارسینومای سینه: روزانه ۱۶۰ میلی گرم در یک دوز یا دوزهای منقسم
- کارسینومای اندومتریم: روزانه ۴۰-۳۲۰ میلی گرم در دوزهای منقسم
- کارسینومای پیشرفته پروستات: روزانه ۱۲۰ میلی گرم در یک دوز همراه ۱/۰ میلی گرم دی اتیل استیل بسترول
- هیپرپلازی اندومتریال: روزانه ۴۰-۲۰ میلی گرم به مدت بیش از ۱۴ روز در هر ماه
- کودکان:
- دوز دارو در این گروه سنی مشخص نگردیده است.

تداخلات دارویی:

- داروهای القا کننده آنزیمهای کبدی مانند کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین یا ریفامپین
- توجه: مجسترول با وارفارین تداخل داشته و زمان تست INR را افزایش میدهد، بنابراین در هنگام مصرف این دو دارو با هم، INR باید به دقت بررسی و پایش گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

رده بارداری: D، بنابراین این دارو نباید در دوران بارداری و همچنین شیردهی تجویز گردد.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از نور و رطوبت محافظت نمایید.
- هره ۱ عدد قرص ۲۰ میلی گرمی برندوکر® در یک بلیسترو هر ۳ بلیستر همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.
- هره ۱۰ عدد قرص ۴۰ میلی گرمی برندوکر® در یک بلیسترو هر ۱۰ بلیستره همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت، با شماره تلفن ۰۲۱-۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سؤالات علمی شما عزیزان است.

