

شیاف استامینوفن

شیاف ۷۵ میلی گرم، ۱۲۵ میلی گرم و ۳۲۵ میلی گرم

مشخصات دارو:

شیاف های استامینوفن، حاوی ۷۵ میلی گرم، ۱۲۵ میلی گرم و ۳۲۵ میلی گرم ماده موثره استامینوفن در پوشش آلومینیومی می باشند.

موارد مصرف دارو:

استامینوفن یک مسکن است که در کنترل سردرد، دردهای عضلانی، درد دندان، آرتريت، سرماخوردگی و تب کاربرد دارد.

موارد منع مصرف:

در صورت بروز حساسیت پوستی مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

حساسیت های پوستی شدید با علائم زیر می باشد:

• قرمزی پوست

• راش جلدی

• تاول

هشدارها و احتیاطات:

• همراه با محصولاتی که حاوی استامینوفن هستند استفاده نشود.

• با مصرف این دارو ممکن است آسیب کبدی ایجاد شود. (مراجعه به بخش عوارض جانبی)

• قبل از مصرف این دارو در شرایط زیر با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید:

۱- ابتلا به نارسایی کبدی

۲- در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین

۳- در صورت مصرف داروهای آرامبخش مانند باربیتورات ها

۴- در صورت مصرف داروهای صرع مانند کاربامازپین، فنوباریتال و فنی توئین

۵- تشدید تب یا عدم کاهش تب بعد از ۳ روز (در کودکان ۳ تا ۳۶ ماهه) و ۵ روز (در کودکان ۳ تا ۶ ساله) یا ۱۰ روز (کودکان بالای ۶ سال یا بزرگسالان)

۶- بروز علائم جدید

۷- وجود تورم یا قرمزی

۸- در صورت بارداری یا شیردهی

نحوه تجویز دارو:

مصرف در بزرگسالان:

کنترل درد و تب: ۶۵۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت از طریق مقعد

حداکثر مقدار مجاز: ۴۰۰۰ میلی گرم در ۲۴ ساعت

مصرف در کودکان:

کنترل درد و تب:

در کودکان زیر ۶ ماه دوز مصرفی توسط پزشک تعیین گردد.

۱۱- ۶ ماه: ۷۵ میلی گرم هر ۶ ساعت تا حداکثر ۴ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز

۱-۳ سال: ۷۵ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تا حداکثر ۵ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز

۳-۶ سال: ۱۲۵ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تا حداکثر ۵ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز

۱۲- ۶ سال: ۳۲۵ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تا حداکثر ۵ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز
بیشتر از ۱۲ سال: ۶۵۰ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تا حداکثر ۶ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز

حداکثر مقدار مجاز: زیر ۱۲ سال: ۵ دوز در ۲۴ ساعت

بالای ۱۲ سال: ۴۰۰۰ میلی گرم در ۲۴ ساعت

بارداری:

مصرف کوتاه مدت در تمامی مراحل بارداری بلامانع است.

شیردهی:

با احتیاط مصرف شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای موجود در لیست زیر پزشک خود را آگاه سازید:

باربیتورات ها، اتانول، فنی توئین، ایزونیازید، سولفین پیرازون، وارفارین، لاموتریژین

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.

۱- افزایش آنزیم های کبدی (قابل برگشت بعد از قطع مصرف دارو)، آسیب کبدی مخصوصاً در مصرف بیش از حد استامینوفن

۲- راش و حساسیت پوستی

شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

دارو را در یخچال نگهداری ننمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

