



شیاف بیزاکودیل

۵ و ۱۰ میلی گرم

دسته دارویی:

ملین (تحریک کننده تماسی)

نحوه عمل و فارماکوکینتیک:

بیزاکودیل یک ملین تحریک کننده تماسی است که بصورت شیاف مستقیماً بر روی مخاط روده بزرگ اثر گذاشته و حرکات دودی شکلی در سرتاسر روده بزرگ ایجاد می کند. جذب دارو بسیار ضعیف و قابل اغماض می باشد. بیزاکودیل در تماس با مخاط یا انشعابات تحت مخاطی روده بزرگ، پایانه های عصبی حسی را تحریک نموده و رفلکس های پاراسمپاتیک ایجاد می نماید و در نتیجه انقباضات پرستالتیک را افزایش می دهد.

این دارو همچنین موجب افزایش تجمع آب و املاح در روده بزرگ گشته و باعث افزایش اثر ملین می گردد. اثر دارو (حرکات روده) معمولاً ۱۵ دقیقه تا یک ساعت پس از استعمال شیاف بروز می نماید.

موارد مصرف:

- جهت برطرف ساختن یبوست غیر دائم و بی نظمی دفع (درمان کوتاه مدت)
- پاک نمودن روده در آماده سازی برای عمل جراحی یا آماده سازی مریض برای آزمایشهای کلونوسکوپی.
- بیزاکودیل را نمی توان به عنوان جایگزین شستشو دهنده های معمول قبل از جراحی بکار برد و صرفاً بعنوان تخلیه کننده اولیه روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
- بیزاکودیل را همچنین نمی توان جهت مراقبت های پس از عمل جراحی، قبل از زایمان، پس از زایمان و جهت آماده سازی برای زایمان بکار برد.

موارد منع مصرف:

- آپاندیسیت یا علایم آن (مانند حالت تهوع، استفراغ و...)
- خونریزی مقعدی بدون تشخیص معین
- نارسایی قلبی
- انسداد روده
- حساسیت به خود دارو

هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف بیزاکودیل در ناراحتی هایی مانند درد ناحیه شکم، تهوع یا استفراغ توصیه نمی شود.
- تجویز طولانی مدت این دارو جهت درمان یبوست مزمن، توصیه نمی شود.
- مدت مصرف بیزاکودیل نباید از ۷ روز تجاوز کند، مگر اینکه توسط پزشک، لازم تشخیص داده شود.
- خونریزی مقعدی یا عدم ایجاد حرکت روده پس از مصرف بیزاکودیل ممکن است نشان دهنده یک وضعیت جدی باشد. در صورت بروز این حالت، مصرف دارو باید متوقف شود.
- در افراد مسن ممکن است مصرف مکرر بیزاکودیل جهت تخلیه روده، باعث از دست دادن مقادیر زیادی آب و املاح (الکترولیت) شده و باعث تشدید حالات ضعف، ناهماهنگی حرکات و افت فشار وضعیتی گردد.

عوارض جانبی (ناخواسته):

- در فرآیند بازبایی فعالیت طبیعی روده با استفاده از بیزاکودیل، ممکن است برخی از ناراحتی های ناحیه شکم (مانند درد، نفخ و...) ایجاد گردد.
- شیاف بیزاکودیل ممکن است باعث ایجاد پروکتیت و التهاب گردد، به همین دلیل مصرف طولانی این دارو توصیه نمی گردد.

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم، یکبار در روز، جهت حرکات روده.
کودکان (۶ تا ۱۲ سال): ۵ میلی گرم، یک بار در روز.

بسته بندی:

۱۰ عدد شیاف بیزاکودیل در استریپ آلومینیومی در یک جعبه. هر شیاف دارای ۵ میلی گرم بیزاکودیل (برای کودکان) یا ۱۰ میلی گرم بیزاکودیل (برای بزرگسالان) می باشد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و درون جعبه نگهداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- مصرف کننده محترم از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴-۰۲۱ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعداز ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

