

کرم و پماد موضعی مومکین® (مومتازون) ۱/۰٪

دسته دارویی:

کورتیکواستروئید

موارد مصرف:

درماتیت تماسی، ریزش مو سکه ای، اگس فولیاتیو ژنرالیزه و سبوره ای، درماتوز التهابی، بیماری لیکن پلانوس، کرونیکوس و استریاتوس، لوپوس اریتماتوز، التهابات جوش مانند پلی مورفیسم، خارش دستگاه تناسلی در زنان، فاز التهابی بیماری زروزیس (خشکی غیرطبیعی چشم، دهان و پوست)، آلوپسی، گرانولومای حلقوی، میگزما، نکروبیوز لیپوئیدی دیابتیک، پمفیگوییید، شوره و سارکوئیدوز.

موارد منع مصرف:

حساسیت به کورتیکواستروئیدها، وجود عفونت و ضایعه های باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی در محل درمان، آتروفی پوست، دیابت ملیتوس، آکنه و لگاریس و رزاسه، آب مروارید، گلوکوم و سل.

عوارض جانبی و نیازمند به توجهات پزشکی:

درماتیک آلرژیک تماسی، فولیکولیت، کورک، جوش چرکی، بروز تاول در قسمت فولیکول های مو، پیودرما، افزایش حساسیت پوست، بی حسی انگشتان، خونریزی زیر پوستی، عفونت و آتروفی پوست، لایه لایه شدن اپیدرم، آکنه، آب مروارید، سندروم کوشینگ، التهابات اطراف دهان، خون مردگی، ادم، زخم معده، گلوکوم ثانویه، هیرسوتیسم، هیپرتریکوز، فشار خون بالا، هیپوکالمی، تغییرات میزان پیگمان های پوست، عفونت، عرق سوز، ضعف عضلات، پارگی پوست، ایجاد خطوط قرمز روی پوست در نواحی مختلف بدن، آتروفی سلولهای زیرجلدی، ریزش غیرطبیعی مو، تاری دید و سرور تینوپاتی مرکزی (در صورت هرگونه تغییر در بینایی، با پزشک خود مشورت کنید).

- عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن: سوزش، خشکی، التهاب، خارش و ورق شدن پوست، راش پوستی
- استفاده طولانی مدت مداوم یا نامناسب از استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بازگشت علائم پس از قطع درمان شود (سندرم ترک استروئید موضعی). فرم شدیدی از بازگشت علائم که به صورت درماتیت همراه با قرمزی شدید، سوزش و گزگز است می تواند حتی در نواحی فراتر از نواحی درمان اولیه ایجاد شده و گسترش یابد. زمانی که دارو در نواحی که پوست نازک تر و ظریف تری دارند مانند صورت استفاده می شود، احتمال بروز این مشکل بیشتر است. در صورت بروز مجدد علائم طی چند روز تا چند هفته بعد از درمان موفق، می توانید احتمال وقوع این سندرم را در نظر بگیرید.
- استفاده مجدد از این دارو می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص، پس از بررسی امکان استفاده از درمان های جایگزین انجام شود.

مقدار مصرف دارو:

در بزرگسالان روزی یک بار به موضع مالیده شود. در مورد کودکان دوز مشخصی تعیین نگردیده است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که کورتیکواستروئیدهای موضعی، جذب سیستمیک دارند و ممکن است موجب ایجاد ناهنجاری در جنین شوند. بخصوص زمانی که مقادیر بالایی از این داروها در موضعی گسترده از بدن برای مدت زمانی طولانی استفاده می شوند. بنابراین مصرف این داروها با این شرایط در زنان باردار یا کسانی که قصد باردار شدن دارند مجاز نمی باشد. احتمال ترشح این دارو در شیر انسان نیز نامعلوم است.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. هر جعبه پماد و کرم مومکین® ۱/۰٪ حاوی یک تیوب ۳۰ گرمی می باشد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت، با شماره تلفن ۰۲۱-۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.