



# میزوتک ۱۰۰، ۲۰۰ میکروگرم

## میزوپروستول

### مشخصات دارو:

میزوتک ۱۰۰ و ۲۰۰ به صورت قرص می باشد. ماده موثره های این قرص میزوپروستول است. هر قرص میزوتک ۱۰۰ و ۲۰۰ به ترتیب حاوی ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرم میزوپروستول می باشد.

### دسته دارویی:

آنالوگ سنتتیک آلپروستادیل (پروستاگلندین E<sub>1</sub>) با محافظت کننده گی موکوس معده

### موارد مصرف:

میزوتک در درمان و پیشگیری از ایجاد زخم های خوش خیم معده و اثنی عشر مرتبط با مصرف داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، خاتمه دادن حاملگی، القای زایمان و مدیریت خونریزی پس از زایمان استفاده می شود.

### موارد منع مصرف:

مانند همه داروها، قرص میزوتک نیز نباید در برخی شرایط استفاده شود. که عبارتند از:

• بارداری (به دلیل ایجاد انقباضات رحمی)

• حساسیت به پروستاگلندین ها

در صورتی که هر یک از شرایط فوق را دارید، یا از داشتن این شرایط اطمینان ندارید، در رابطه با سایر راه های کنترل بیماریتان با پزشک صحبت کنید.

### بارداری و شیردهی:

بارداری

اگر فکر می کنید باردار هستید یا می خواهید باردار شوید، باید پزشک خود را در جریان بگذارید. تجویز این دارو در دوران بارداری توصیه نمی گردد.

شیردهی

میزوپروستول در شیر ترشح می گردد و تجویز این دارو در دوران شیردهی نیز توصیه نمی شود.

### موارد هشدار و احتیاط:

در صورت مستعد بودن به افت فشار خون، قبل از مصرف قرص میزوتک، به پزشک خود اطلاع دهید.

### تداخلات دارویی:

اگر داروی دیگری مصرف می کنید، یا اخیراً داروی دیگری مصرف کرده اید (که شامل داروهای بدون نسخه هم می شود)، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این امر در رابطه با داروهای حاوی منیزیم مثل منیزیم هیدروکساید، منیزیم سولفات، منیزیم اکساید و منیزیم سیترات از اهمیت بیشتری برخوردار است.

### مقدار و نحوه مصرف دارو:

همیشه دارو را دقیقاً به نحوی که پزشک برایتان تجویز کرده است استفاده کنید. این کار به افزایش اثربخشی و کاهش عوارض جانبی دارو برای شما کمک می کند.

• در درمان زخم های خوش خیم معده و اثنی عشر، ۸۰۰ میکروگرم در روز، در ۲ یا ۴ دوز منقسم همراه با غذا

• دوز معمول برای خاتمه دادن بارداری ۴۰۰ میکروگرم در یک دوز از راه دهانی، ۳۶ تا ۴۸ ساعت پس از مصرف میفپریستون

• در پیشگیری از بروز زخم های گوارشی متعاقب مصرف NSAID ها دوز معمول ۲۰۰ میکروگرم ۲ تا ۴ بار در روز. برای بیمارانی که دوز بالا را تحمل نمی کنند می توان از ۱۰۰ میکروگرم ۴ بار در روز استفاده کرد.

مصرف بیش از مقدار توصیه شده:

در صورت مصرف تعداد قرص بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک یا مصرف قرص توسط فردی دیگر، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

تا کنون دوز سمی میزوپروستول در انسان مشخص نشده است. تا حداکثر دوز جمعی ۱۶۰۰ میکروگرم در روز تنها با بروز برخی علائم ناراحتی گوارشی، در انسان تحمل می شود. علائم بالینی که ممکن است نشان دهنده مصرف بیش از اندازه این دارو باشند، عبارتند از: خواب آلودگی، لرزش، تشنج، تنگی نفس، درد شکم، تب، تپش قلب، افت فشار خون یا برادی کاردی. در صورت بروز این علائم، بیمار می بایست درمان حمایتی دریافت کند.

### عوارض جانبی:

مانند همه داروها، قرص میزوتک می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، هرچند که در همه افراد به طور یکسان بروز نمی یابند.

شایع ترین عارضه به دنبال مصرف میزوتک اسهال است. از دیگر عوارض گوارشی می توان به درد شکم، سوء هاضمه، نفخ شکم، حالت تهوع و استفراغ اشاره کرد. همچنین عوارضی نظیر افزایش انقباضات رحم، خونریزی غیرطبیعی از واژن، بثورات جلدی، سردرد، سرگیجه و افت فشار خون ممکن است با مصرف میزوتک دیده شود.

### شرایط نگهداری:


• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته بندی اصلی و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

• دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



# Misotec 100,200mcg

## Misoprostol



### Drug description:

Misotec 100 and 200 are available tablet. The active ingredient is misoprostol. Each Misotec 100 or 200 tablet contains 100 mcg or 200mcg misoprostol.

### Category:

Misotec is a synthetic prostaglandin E1 analog with gastric antisecretory and (in animals) mucosal protective properties

### Indications:

Misotec is used in the treatment of benign gastric and duodenal ulceration including that associated with NSAIDs, prophylactically with NSAIDs to prevent NSAID-induced ulcers, termination of pregnancy at up to 49 days of amenorrhea, induction of labour and in the management of postpartum hemorrhage.

### Contraindication:

You should NOT be given Misotec tablet if you:

- Are pregnant or may become pregnant
- Have known history of allergy to prostaglandins

Talk with your doctor about other ways of managing your disease if any of the above applies to you or you are not sure about them.

### Pregnancy/Breast feeding:

#### Pregnancy

Misotec should not be used to treat peptic ulcer disease in patients who are pregnant or who may become pregnant because it can cause uterine contraction and abortion.

#### Breast-feeding

A decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

### Warning and Precaution:

Talk to your doctor or pharmacist before taking Misotec tablet if hypotension might cause severe complications for you.

### Drug Interaction:

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription. This applies especially to the magnesium containing medicines such as magnesium hydroxide, magnesium sulfate, magnesium citrate and magnesium oxide.

### Dosage and Administrations:

- The usual dose in the treatment of benign gastric and duodenal ulceration by mouth is 800 micrograms daily in two to four divided doses with food.
- Misotec is also used prophylactically with NSAIDs to prevent NSAID-induced ulcers.
- The usual dose is 200 micrograms two to four times daily. A dose of 100 micrograms four times daily may be used in patients not tolerating the higher dose.
- The usual dose for termination of pregnancy at up to 49 days of amenorrhea, in a single dose of 400 micrograms by mouth given 36 to 48 hours after mifepristone.

#### If you take more misotec than you should

If you have taken too many tablets of misotec, or if someone else has taken your tablets, consult a doctor immediately.

The toxic dose of Misotec in humans has not been determined. Cumulative total daily doses of 1600 mcg have been tolerated, with only symptoms of gastrointestinal discomfort being reported.

Clinical signs that may indicate an overdose are sedation, tremor, convulsions, dyspnea, abdominal pain, diarrhea, fever, palpitations, hypotension, or bradycardia. Symptoms should be treated with supportive therapy.

### Side effects:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. The commonest adverse effect of Misotec is diarrhea. Other gastrointestinal effects include abdominal pain, dyspepsia, flatulence, and nausea and vomiting. Increased uterine contractility and abnormal vaginal bleeding (including menorrhagia and intermenstrual bleeding) have been reported. Other adverse effects include skin rashes, headache, dizziness and hypotension.

### Storage:

- Store below 30° C in the original package in order to protect from moisture and light.
- Keep out of reach of children.



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.

Manufactured by **Aburaihan** Pharma.Co.  
Tehran-Iran



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.