

پماد آنتی هموروئید

مشخصات دارو:

لیدوکائین ۵ گرم + هیدروکورتیزون استات ۲۷۵/۵ گرم + آلومینیوم ساب استات ۳/۵ گرم + زینک اکساید ۱۸ گرم، مواد فعال دارویی پماد آنتی هموروئید میباشد.

دسته دارویی:

ضد هموروئید

موارد مصرف:

پماد آنتی هموروئید جهت درمان هموروئید داخلی و دیگر اختلالات مجرای مقعدی مانند التهاب راست روده، شقاق همراه با فیستول، آزرده و خارش اطراف مقعد و ادم بعد جراحی مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

در موارد حساسیت مفرط نسبت به ترکیبات این پماد، در بیماران مبتلا به عفونت ثانویه، ضایعات قارچی، ویروسی و ضایعات سلی مقعد منع مصرف دارد. در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

استعمال این دارو در بارداری و شیر دهی تنها با توصیه پزشک می باشد.

موارد هشدار و احتیاط:

بیماران حساس، بیمارانی که مخاط آنها به شدت آسیب دیده و یا دچار عفونت است، تحت درمان با سایر کورتیکواستروئید

کورتیکواستروئید موجود در این دارو (هیدروکورتیزون) می تواند موجب عوارض چشمی همچون آب مروارید و گلوکوم شود. بنابر این در صورت بروز هرگونه تغییر در بینایی با پزشک خود مشورت کنید.

تداخلات دارویی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی، ممکن است عوارض جانبی ناخواسته در افراد ایجاد کند هرچند که همه عوارض جانبی در همه افراد دیده نمی شود. در صورت استفاده از داروهای زیر حتما پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای بتا بلاکر (مانند پروپرانولول) از طریق کاهش جریان خون کبدی، ممکن است سرعت متابولیسم لیدوکائین موجود در فرآورده را کاهش دهد.

سایمتیدین از طریق کاهش متابولیسم داروهای موجود در این فرآورده، ممکن است متابولیسم آنها را به تاخیر بیندازد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

یک اپلیکاتور پماد، صبح و شب بر حسب نیاز و بر اساس دستور پزشک مصرف شود.

نکات قابل توصیه در مصرف پماد آنتی هموروئید:

- قبل از استعمال پماد، مقعد را کاملاً با آب و صابون شسته و تمیز نمایید.

- قبل و پس از استفاده از اپلیکاتور، برای زدن پماد، آن را با آب و صابون شسته و تمیز نمایید.

- چنانچه استعمال یک نوبت دارو را فراموش کردید، به محض یاد آوردن آن را استفاده کنید، ولی اگر استعمال نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف دو برابر دارو خودداری کنید.

سمیت / عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک مشورت کنید:

در صورت مصرف بیش از حد دارو، عوارض سیستمیک ممکن است بروز نماید:

عصبانیت، سرگیجه، تاری دید، سرور رتینوپاتی مرکزی، لرزش، خواب آلودگی، بیهوشی و تشنج، ضعف تنفسی، کاهش فشار خون، ضعف میوکارد، برادیکاردی، ضایعات جلدی، کهیر، ادم، واکنشهای شبه آنافیلاکتیک.

در صورت بروز عوارضی مثل خارش، قرمزی، راش پوستی، سوزش، درد، واکنش های حساسیتی و خونریزی مقعدی که قبل از استعمال دارو وجود نداشته است به پزشک خود مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. • دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

