

لیدوکائین اچ

مشخصات دارو:

پماد لیدوکائین اچ حاوی دو داروی لیدوکائین و هیدروکورتیزون می باشد که لیدوکائین از دسته داروهای بی حس کننده موضعی و هیدروکورتیزون از دسته داروهای کورتیکواستروئیدی می باشد. پماد لیدوکائین اچ در تیوب های آلومینیومی ۱۵ گرمی عرضه میگردد که حاوی ۵٪ لیدوکائین و ۰/۵٪ هیدروکورتیزون استات می باشد.

موارد مصرف دارو:

ترکیب لیدوکائین و هیدروکورتیزون در تخفیف و تسکین درد و خارش ناشی از هموروئید، آفتاب سوختگی، سوختگی های خفیف، گزش یا نیش حشرات مورد مصرف قرار می گیرد.

نحوه مصرف:

دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
از مصرف این دارو بر روی زخم باز و پوست ملتهب خودداری نمایید مگر اینکه تحت درمان پزشک باشید.

مصرف موضعی: لایه نازکی از پماد روزانه دو تا سه بار یا طبق دستور پزشک بر روی پوست مالیده شود.

در کودکان به دلیل احتمال جذب بیشتر این فرآورده و احتمال سمیت با دارو، با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به لیدوکائین و هیدروکورتیزون و در صورت وجود عفونت در محل مصرف دارو، از مصرف این دارو خودداری نمایید.

موارد هشدار و احتیاط:

اگر علائم بیماری رو به وخامت باشد، پزشک خود را مطلع سازید.
در صورت بروز التهاب، سوزش و گز شدن پوست در محل مورد مصرف دارو، از مصرف آن خودداری نموده و پزشک خود را آگاه سازید.

از مصرف فرآورده های آرایشی بر روی پوست تحت درمان با دارو خودداری نمایید.
از مصرف این فرآورده در داخل دهان، بینی، گوش ها و چشم ها خودداری کنید. در صورت برخورد فرآورده با چشم ها، بلافاصله چشم های خود را با آب شست و شو دهید.
از مصرف این فرآورده به شکل گسترده، یا پوشش آن با پانسمان خودداری کنید. (مگر اینکه طبق دستور پزشک باشد).

در صورت مصرف این دارو در ناحیه ی پوشک در نوزادان، از استفاده ی پوشک های تنگ خودداری نمایید.

جزء کورتیکواستروئیدی این دارو می تواند باعث عوارض چشمی همچون آب مروارید و گلوکوم شود. در صورت مشاهده هر گونه تغییر در بینایی، با پزشک خود مشورت کنید.
قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود درباره ی موارد ذیل مشورت نمایید.
ابتلا به دیابت، بیماریهای کبدی، بیماریهای چشمی، وجود ضایعات پوستی ناشی از سل، آبله مرغان و تب خال و عفونت های قارچی پوست.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری / شیردهی، قبل از مصرف دارو پزشک خود را مطلع سازید.
مصرف این دارو تنها در صورت نیاز در بارداری مورد مصرف قرار گیرد.
از مصرف این دارو در مقادیر زیاد یا مدت زمان طولانی در بارداری خودداری کنید.
مصرف این دارو در دوران شیر دهی با احتیاط صورت گیرد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر پزشک خود را مطلع سازید.
این دارو می تواند با برخی از داروهای ضد آریتمی قلبی تداخل داشته باشد و باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

احساس سوزش در نواحی باز پوست، سرورزینیوپاتی مرکزی و تاری دید.
قرمزی و بی حسی در ناحیه مصرف

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.
دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

