

پماد و کرم جلدی **فلوئوسینولون** استوناید ۰/۰۲۵ %

مشخصات دارو:

فلوئوسینولون استوناید از دسته ی داروهای کورتیکواستروئیدی می باشد. پماد و کرم ۱۵ گرمی این دارو حاوی ۰/۰۲۵ گرم فلوئوسینولون استوناید به عنوان ماده ی موثره در هر ۱۰۰ گرم می باشد.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

فلوئوسینولون استوناید در درمان علامتی اختلالات آلرژیک و با التهابی پوست نظیر اگزما، انواع درماتیت، لوپوس اریتماتوز، پسوریازیس، نیش حشرات و پمفیگوس بکار میرود.

مقدار و نحوه ی مصرف دارو:

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است.
بزرگسالان: ۴-۲ بار در روز بر روی ضایعه پوستی مالیده شود.
کودکان: کمترین دوز موثر مورد مصرف قرار گیرد زیرا مصرف بلند مدت این دسته دارو می تواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کند.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به فلوئوسینولون استوناید از مصرف دارو خودداری نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
- وجود هر گونه حساسیت به فلوئوسینولون استوناید یا سایر داروهای کورتیکواستروئیدی
- در صورت ابتلا به سل، دیابت، گلوکوم و آب مروارید (کاتاراکت). در صورت بروز هرگونه تغییر در بینایی، با پزشک خود مشورت کنید.
- از تماس دارو با چشمها خودداری کنید. در صورت تماس احتمالی دارو با چشمها، سریعاً چشمهای خود را با آب بشویید.
- از بکار بردن پانسمان یا روکش دیگر بر روی ناحیه تحت درمان خودداری کنید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.
- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.
- از مصرف دارو برای مشکلات پوستی دیگر بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- مصرف این دارو در کودکان بمدت بیش از دو هفته و یا مصرف بیش از یکبار در روز و یا در وسعت زیاد از سطح بدن حتماً باید طبق نظر پزشک معالج و با احتیاط زیاد صورت گیرد.
- استفاده طولانی مدت مداوم یا نامناسب از استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بازگشت علایم پس از قطع درمان شود (سندرم ترک استروئید موضعی). فرم شدیدی از بازگشت علایم که به صورت درماتیت همراه با قرمزی شدید، سوزش و گزگز است می تواند حتی در نواحی فراتر از نواحی درمان اولیه ایجاد شده و گسترش یابد. زمانی که دارو در نواحی که پوست نازک تر و ظریف تری دارند مانند صورت استفاده می شود، احتمال بروز این مشکل بیشتر است. در صورت بروز مجدد علائم طی چند روز تا چند هفته بعد از درمان موفق، می توانید احتمال وقوع این سندرم را در نظر بگیرید.
استفاده مجدد از این دارو می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص، پس از بررسی امکان استفاده از درمان های جایگزین انجام شود.

بار داری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که مزیت مصرف آن نسبت به خطرات آن برای جنین قابل توجیه باشد. با این حال مصرف این دسته داروها در خانم های بار دار نباید در مقادیر بالا و یا مدت زمان طولانی صورت گیرد.
مصرف این دارو در شیر دهی با احتیاط صورت گیرد.

عوارض جانبی:

مانند همه داروهای دیگر، فلوئوسینولون استوناید می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو، این عوارض را تجربه نمی کنند. لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.
در صورت مشاهده هرگونه تغییر در بینایی با پزشک خود مشورت کنید.

خونریزی زیر پوستی، سوختگی و خارش و قرمزی پوست، بی حسی انگشتان، عفونتهای پوستی، نازک شدن پوست همراه با پوسته ریزی، افزایش قند ادرار و خون، آکنه یا پوست چرب، کمر درد، افزایش فشار خون، دوره ی قاعدگی نامنظم، کاهش اشتها، گرفتگی عضلانی (درد یا ضعف عضلانی)، تهوع و استفراغ، تغییر رنگ پوست، پوسته ریزی غیر معمول، افزایش غیر معمول در رشد مو و بدتر شدن عفونت، سرور رتینو پاتی مرکزی و تاری دید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.

