



قرص اوسپت-اچ دی®

مشخصات دارو:

در هر جعبه یک یا ده بلیستر ۲۱ عددی قرص سفید رنگ کنتراستپتو اچ دی وجود دارد. (هر قرص حاوی ۰/۲۵ میلی گرم لوونورژسترل و ۰/۰۵ میلی گرم اتینیل استرادیول استات می باشد)

دسته دارویی:

ضد بارداری (استروژن - پروژستین)

راهنمای عمومی جهت مصرف دارو:

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

- ۱- در صورت وجود هر نوع بیماری
- ۲- در صورت مصرف دارو های دیگر نظیر آنتی بیوتیکها، کورتیکو استروئیدها، ضد افسردگیهای سه حلقه ای، ریفامپین، گریزوفلووین، ضد انعقادهای خوراکی، فنی توئین، کارباماپین و..
- ۳- در صورت نیاز و انجام جراحی و هرگونه تست آزمایشگاهی
- ۴- در صورت شیر دهی، بارداری و یا احتمال بارداری

مقدار و نحوه مصرف دارو:

برای پیشگیری از بارداری:

۱- این قرص بصورت رژیم ۲۱ روزه مصرف می شود. بدین ترتیب که اولین قرص آن از روز اول تا پنجم قاعدگی مصرف می شود و پس از ۲۱ روز به مدت ۷ روز مصرف قرص قطع می شود و از روز هشتم بدون توجه به قطع شدن خونریزی قاعدگی رژیم ۲۱ روزه بعدی شروع می شود. در صورت:

- ۱- فراموشی یک نوبت از مصرف دارو: شب بعد دو قرص استفاده شود و بعد دوره درمان بصورت معمول ادامه پیدا کند.
- ۲- فراموشی دو شب پایانی طی دو هفته ۱ و ۲ سیکل: لازم است ۲ شب بعد، هر بار ۲ قرص مصرف و تا ۷ روز از روشهای دیگر پیشگیری از بارداری استفاده شود.
- ۳- فراموشی دو شب پایانی طی هفته ۳ سیکل (و یا سه نوبت پایانی و یا بیشتر): قرصهای باقیمانده از این دوره را دور انداخته، بسته جدید را شروع کنید و تا ۷ روز بعد از روشهای دیگر پیشگیری از بارداری استفاده شود.

جلوگیری از بارداری پس از مقاربت:

طی ۷۲ ساعت اول پس از مقاربت (ترجیحا ۱۲ ساعت اول) ۲ قرص و ۱۲ ساعت بعد مجددا دو قرص دیگر مصرف شود.

موارد منع مصرف :

در صورت وجود ترومبوفلیبیت، اختلالات ترمبوآمبولی و یا سابقه آن، بیماریهای عروق مغز و کرونر، در صورت وجود سرطان سینه، آندومتر و موارد مشکوک به آن، در صورت بارداری و موارد مشکوک به آن، در صورت سابقه زردی کلاستاتیک طی دوره بارداری یا هنگام استفاده قبلی از قرصهای ضد بارداری، ترشح یا خونریزی غیر عادی از واژن.

موارد احتیاط:

- ۱- استفاده از قرصهای ضد بارداری از انتقال ایدز و سایر بیماریهای مقاربتی جلوگیری نمی کند.
- ۲- در صورت ترمبوفلیبیت آمبولی ریه، MI، خونریزی مغزی، تومور کبدی، بیماریهای صفراوی سریع با پزشک تماس بگیرید.
- ۳- در صورت بروز افسردگی شدید در بیمارانی با سابقه افسردگی مصرف دارو باید قطع شود.
- ۴- استفاده از این دارو ممکن است به احتباس مایعات بیانجامد و لذا در افراد مبتلا به اختلالات تشنجی، میگرن، آسم، اختلال در عملکرد قلب و کبد و کلیه با احتیاط مصرف شود.

هشدارها:

- کشیدن سیگار (همراه با مصرف کنتراستپتو) خطر بروز عوارض قلبی- عروقی را افزایش می دهد. این خطر با افزایش سن (خصوصا بالاتر از ۳۵ سال) و تعداد سیگار (بیش از ۱۵ سیگار در روز) بیشتر می شود.
- ۲- مصرف این دارو در دوران شیر دهی توصیه نمی شود.
- ۳- استفاده از این دارو خطر بروز سکته قلبی، حمله مغزی، نئوپلاسم کبدی و بیماریهای صفراوی را افزایش می دهد و احتمال وقوع این مشکلات بویژه در صورت وجود هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی، چاقی و دیابت افزایش می یابد.
- ۴- بهتر است بیمار مرتباً سینه های خود را برای کشف علائم احتمالی سرطان سینه معاینه نماید.
- ۵- بروز برخی عوارض جانبی نظیر سر درد، سرگیجه، تهوع، لکه بینی، و بی نظمی در قاعدگی طی ۳ تا ۶ ماه نخست مصرف دارو شایع است که اغلب با ادامه درمان رفع می شود.
- ۶- اگر در یک نوبت خونریزی روی نداد دارو را طبق برنامه ادامه دهید و اگر دو نوبت پایانی خونریزی روی نداد مصرف دارو را قطع کرده، تست بارداری انجام شود.
- ۷- جهت کاهش تهوع و سردرد بهتر است قرص شبها پیش از خواب مصرف شود.

شرایط نگهداری :

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

شرکت داروسازی
ابوریحان



مصرف کننده محترم: از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعداز ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.



Aburaihan
Pharmaceutical Co.