



# اینوتیو® ۲۵/۵، ۶/۲۵ و ۱۲/۲۵

## کارودیلول

### قرص اینوتیو® ۲۵/۵، ۶/۲۵ و ۱۲/۲۵ میلی گرم

#### موارد مصرف:

کارودیلول به دسته بلوکه‌کننده‌های بتا آدرنالین وابسته است که با تغییر پاسخ به بعضی پالس‌های عصبی در بخش‌های معینی از بدن عمل می‌کند و با کم کردن کار قلب نیاز قلب را به خون و اکسیژن کاهش می‌دهد. اینوتیو® برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود فشار خون بالا، بار کاری قلب و سرخرگ‌ها را افزایش و در طولانی مدت عملکرد قلب و سرخرگ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد به رگ‌های خونی مغز و کلیه آسیب وارد کرده و باعث نقصان این اعضا می‌شود. فشار خون بالا خطر حمله‌های قلبی را افزایش می‌دهد، البته اگر فشار خون کنترل شود، مشکلات فوق کمتر اتفاق می‌افتد. اینوتیو® برای درمان عدم کارایی بطن چپ بعد از حملات قلبی استفاده می‌شود، عدم کارایی بطن چپ ممکن است همراه با بزرگ شدن آن موجب انباشته شدن شش‌ها از خون شود.

#### آلرژی‌ها:

اگر هرگونه آلرژی یا واکنش غیرعادی به اینوتیو® داشته‌اید پزشک خود را مطلع سازید، همچنین اگر به مواد دیگر از قبیل غذاها، نگهدارنده‌ها یا رنگ‌ها آلرژی دارید.

#### بارداری:

کارودیلول در زنان باردار مطالعه نشده است. اما مطالعه در حیوانات نشان داده که مصرف میزان زیاد اینوتیو می‌تواند موجب کاهش وزن بدن و مشکلات اسکلتی در جنین موش صحرایی بشود. قبل از استفاده دارو اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید با پزشک خود مشورت کنید.

#### شیردهی:

مشخص نیست که کارودیلول وارد شیر می‌شود یا نه، اما وارد شیر موش صحرایی می‌شود به دلیل امکان وقوع واکنش‌های خطرناک در کودکان مصرف کارودیلول در زنان شیرده توصیه نمی‌شود.

#### کودکان:

این دارو فقط در بزرگسالان مطالعه شده است و اطلاعات ویژه ای راجع به مقایسه اثرات دارو در کودکان نسبت به بزرگسالان در دست نیست.

#### افراد مسن:

اگرچه این دارو اثرات متفاوتی در بیماران مسن تر نسبت به بیماران جوان تر نشان نداده است اما سطح کارودیلول در خون افراد مسن ممکن است بالاتر باشد و دفعات احساس گیجی در آنها می‌تواند بیشتر باشد.

#### تداخلات دارویی:

اگرچه داروهای معین نباید همزمان استفاده شود، در مواردی دو داروی مختلف باید با هم مصرف شوند. حتی اگر برهم کنش داشته باشند. در این موارد ممکن است پزشک شما بخواهد میزان مصرف شما را تغییر داده یا احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرد. اگر همزمان با مصرف اینوتیو® داروهای زیر را مصرف می‌کنید پزشکتان را مطلع سازید:

- **داروهای ضد دیابت:** سولفونیل اوره‌ها مثل کلروپروپامید، گلیکلازید، گلیپیزید، تولیوتامید، تلازامید.
- **انسولین:** اینوتیو® ممکن است قند خون را بیشتر کاهش دهد.
- **داروهای مسدود کننده کانال کلسیم به ویژه دیلتیازم یا وراپامیل:** اینوتیو® ممکن است اثرات جانبی این داروها را شدیدتر کند.

#### مشکلات پزشکی:

وقوع مشکلات پزشکی ممکن است استفاده از اینوتیو® را تغییر بدهد. اگر مشکلات پزشکی دیگری دارید حتماً به پزشک خود بگویید؛ به ویژه:

- واکنش آلرژیک سخت شامل آماس صورت یا تنفس مشکل و سابقه آن
- آسم
- **شرایط مربوط به تنگی نایژه‌ها:** اینوتیو® ممکن است شرایط را بدتر کنند و پاسخ روش‌های درمانی را کم کند.
- **آنژین:** اینوتیو® ممکن است در قفسه سینه ایجاد درد و ناراحتی کند.
- برونشیت
- نفخ
- دیابت

**قند خون پایین:** اینوتیو® ممکن است سطح قند خون را به وسیله انسولین پایین بیاورد و ممکن است بهبود سطح قند خون را به تاخیر بیندازد.

#### مشکلات کلیوی

**مشکلات کبدی:** تاثیر اینوتیو® ممکن است به دلیل متابولیسم کندتر از بدن افزایش یابد.

**تیروئید پرکار:** اینوتیو® ممکن است علائم را افزایش دهد. از قبیل ضربان تند قطع یکباره مصرف اینوتیو® ممکن است این تحریکات را زیادتر کند.

#### چگونگی استفاده دارو:

اگر دارو را در زمان‌های معین در روز استفاده کنید اثر آن بهتر می‌شود. دارو را بیشتر از میزان تجویز شده توسط پزشکتان مصرف نکنید. هرگز یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نکنید. دارو را با غذا دریافت کنید ممکن است پزشک شما بخواهد با کاهش تدریجی مصرف اینوتیو® مصرف آن را قطع نماید. اگر دارو ناگهانی قطع شود ممکن است شرایط بدتر شود که می‌تواند خطرناک باشد.

#### مقدار مصرف:

مقدار مصرف اینوتیو® برای بیماران مختلف متفاوت است. در مصرف دارو از دستور پزشک خود یا برچسب دارو پیروی کنید. بدون نظر پزشک خود مقدار مصرف آن را تغییر ندهید. تعداد قرص‌هایی که دریافت می‌کنید، دفعات مصرف در روز، فاصله زمانی بین دفعات مصرف و مدت زمانی که دارو را دریافت می‌کنید، به قدرت دارو بستگی دارد.

#### مشکلات قلبی:

- **بزرگسالان:** ۱۲/۵ میلی گرم سه بار در روز همراه با غذا پزشک شما ممکن است اگر لازم باشد میزان مصرفتان را تغییر دهد.
- **کودکان:** فقط به وسیله پزشک تعیین میشود.

#### مشکلات بطن چپ بعد از حمله قلبی:

- **بزرگسالان:** ۶/۲۵ میلی گرم دو بار در روز همراه با غذا، پزشک شما ممکن است اگر لازم باشد میزان مصرفتان را تغییر دهد.
- **کودکان:** فقط به وسیله پزشک تعیین می‌شود.

#### دوز فراموش شده:

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، آن را به سرعت مصرف کنید. اگر نزدیک به نوبت بعدی به یاد آورید، آن را استفاده نکنید. هرگز دارو را دو برابر نکنید.

#### احتیاط:

در مدت مصرف دارو به طور منظم توسط پزشک خود تحت نظر باشید که اگر لازم بود مصرف را متوقف کرده یا تغییر دهد. داروهای دیگر را بدون مشورت با پزشکتان به طور همزمان مصرف نکنید دارو ممکن است باعث گیجی، سردرد ناشی از نور یا غش بشود. قبل از رانندگی دارو را مصرف نکنید. قبل از انجام هر گونه عمل جراحی با پزشکتان مشورت کنید. برای بیماران دیابتی دارو ممکن است موجب تغییر در میزان قند خون بشود یا واکنش‌های ناشی از افزایش قند خون مانند ضربان سریع را پوشش دهد. برای افراد دارای ضایعات قلبی اگر تنفس‌های کوتاه مشاهده شد با پزشک مشورت کنید، چون ممکن است شرایط بدتر شود. برای بیمارانی که لنز چشمی دارند ممکن است باعث کاهش تولید اشک بشود، اگر چشمانتان بیش از حد خشک بود با پزشک مشورت کنید.

#### اثرات جانبی:

در مدت زمان نیاز به مصرف دارو، یک دارو ممکن است موجب بروز عوارض ناخواسته‌ای بشود. اگرچه ممکن است همه این عوارض ایجاد نشود، اما وقوع هر کدام به توجهات پزشکی خاصی نیاز دارد. اگر هر کدام از عوارض زیر را مشاهده کردید با پزشک خود در میان بگذارید.

#### اغلب:

آلرژی، درد یا ناراحتی در قفسه سینه، خفگی یا سنگینی، گیجی، سردرد ناشی از نور، غش، درد، تنفس کوتاه، ضربان قلب کند، ورم کلی یا ورم در پاها، قوزک و ساق پاها افزایش وزن.

#### بندرت:

درد در قوزک یا زانو، اضطراب، درد در بازو پشت یا فک، خون در ادرار، تیرگی مدفوع، تیرگی ادرار، افزایش دفعات و میزان ادرار، افسردگی، سختی تنفسی، گیجی، خشکی دهان، ضربان تند و نامنظم، خشکی پوست، قرمزی پوست، کوفتگی، عدم توانایی تکلم، کاهش اشتها، خارش، افزایش کلسترول خون، زردی چشم و پوست، فقدان هوشیاری، درد معده، درد ماهیچه، ضعف پاها و بازوها.

#### مشکلات ناشناخته:

زخم‌ها، لکه‌های سفید در لب‌ها یا دهان، آماس یا درد در غدد لنفاوی، خس خس کردن.

#### نحوه نگهداری و نوع بسته بندی:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هر جعبه قرص اینوتیو® ۲۵/۵، ۶/۲۵ و ۱۲/۲۵ میلی گرم، حاوی ۶ بلیسترو هر بلیستر حاوی ۱۰ عدد قرص می‌باشد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ - ۰۲۱ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان  
تهران - ایران

شرکت داروسازی  
ابوریحان



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.