

# فیناید® ۱ و ۵

## فیناستراید

### قرص روکشدار فیناید® (فیناستراید) ۱ و ۵ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

#### راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.
- در صورت ابتلاء و یا سابقه ابتلاء به سایر بیماری ها خصوصاً بیماری های کبدی.

#### مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

- دوز توصیه شده در درمان ریزش مو در آقایان یک میلی گرم خوراکی برای یکبار در روز می باشد. جهت مشاهده آثار دارو، درمان حداقل برای مدت سه ماه یا بیشتر لازم می باشد. قطع مصرف دارو پس از ۱۲ ماه منجر به بازگشت ریزش می گردد.
- دوز توصیه شده در درمان عوارض هیپرپلازی خوش خیم پروستات پنج میلی گرم خوراکی برای یکبار در روز می باشد. در این مورد دارو را می توان به تنهایی یا همراه با مهارکننده های گیرنده آلفا به کار برد.

**توجه:** فیناید® را می توان همراه یا بدون غذا مصرف کرد. نیازی به تنظیم دوز دارو در بیماران دچار نارسایی کلیوی یا افراد مسن نمی باشد.

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف فیناید® در خانم های شیرده، باردار و یا آنهایی که قصد باردار شدن دارند، ممنوع است.

#### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارضی ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض مشاهده شده با مصرف این دارو معمولاً خفیف و گذرا بوده و عبارتند از: ناتوانی جنسی، کاهش میل جنسی، کاهش حجم انزال، اختلال در انزال، بزرگ شدن پستان ها، درد در پستان ها، ضعف، سردرد، کاهش فشار خون، افت فشار خون وضعیتی، ادم موضعی، سرگیجه، بی خوابی، سخی تنفس، رینیت، واکنش های حساسیتی و درد در بیضه ها.

#### مسمومیت:

احتمال مسمومیت با این دارو در اثر مصرف مقادیر بیش از حد آن وجود ندارد.

#### هشدارها:

- مصرف این دارو به هیچ عنوان در کودکان و زنان شیرده و باردار توصیه نمی شود.
- در صورت ابتلاء به بیماری های کبدی حتما موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید.
- این دارو می تواند احتمال ابتلا به سرطان پروستات را افزایش دهد.
- این دارو می تواند موجب ایجاد افسردگی و افزایش احتمال ایجاد افکار خودکشی شود. در صورت بروز این اتفاق، با پزشک خود مشورت کنید.
- ماده موثره داروی فیناستراید داخل قرص های خرد شده یا شکسته شده میتواند از سطح پوست جذب شود. زنان نباید به قرص های خرد یا شکسته شده و مایع منی مردانی که در حال مصرف فیناستراید هستند، تماس پوستی داشته باشند.

#### تداخلات دارویی:

هیچگونه تداخل دارویی قابل ذکری در خصوص این دارو مشاهده نشده است.

#### شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

#### بسته بندی:

- قرص روکشدار فیناید® در دو دوز یک و پنج میلی گرمی توسط شرکت داروسازی ابوریحان تولید می گردد.
- قرص های یک میلی گرمی به رنگ گل بهی بوده و هر ۱۰ قرص در یک بلیسترو هر سه بلیستربه همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرند.
- قرص های پنج میلی گرمی به رنگ آبی بوده و هر ۱۰ قرص در یک بلیسترو هر سه بلیستربه همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرند.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت، با شماره تلفن ۰۲۱ ۷۷۷۱ ۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سؤالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان  
تهران - ایران

شرکت داروسازی  
ابوریحان



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.

# FINIDE® 1 & 5

## FINASTERIDE

### Finide® 5 & 1 (Finasteride) EC tablets

#### Drug Description:

Finasteride, a synthetic 4-azasteroid compound, is a specific inhibitor of steroid Type II 5 (alpha)-reductase, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5 (alpha)-dihydrotestosterone (DHT).

#### Composition:

Each tablet contains: Finasteride 1 or 5 mg

#### Clinical Pharmacology:

Finasteride is a competitive and specific inhibitor of Type II 5 (alpha)-reductase, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into DHT. Administration of Finide® decreases scalp and serum DHT concentrations in men.

#### Pharmacokinetics:

Absorption of Finasteride is not affected by food. There is a slow accumulation phase for Finasteride after multiple dosing. Finasteride has been found to cross the blood-brain barrier. Finasteride is extensively metabolized in the liver, primarily via the cytochrome P3 450A4 enzyme subfamily.

#### Indications and usage:

Finide® 1 mg tablet is indicated for the treatment of male pattern hair loss (androgenetic alopecia) in MEN ONLY. Finide® 5 mg tablet is indicated for the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia (BPH) in men with an enlarged prostate to: Improve symptoms, reduce the risk of acute urinary retention, reduce the risk of the need for surgery including transurethral resection of the prostate (TURP) and prostatectomy. Finide® is not indicated in women. Finide is not indicated in children.

#### Contraindications:

Finide® is contraindicated in the following:

- Pregnancy: Finide® use is contraindicated in women when they are or may potentially be pregnant.
- Hypersensitivity to any component of this medication.

#### Warnings:

Finide® is not indicated for use in pediatric patients or women. Women should not handle crushed or broken Finide® tablets because of the possibility of absorption of Finide® and the subsequent potential risk to a male fetus. Finide® tablets are coated and will prevent contact with the active ingredient during normal handling, provided that the tablets have not been broken or crushed. Women should not be in skin contact with the semen of a male who is taking Finasteride.

#### Precautions:

Caution should be used in the administration of Finide® in patients with liver function abnormalities, as Finide® is metabolized extensively in the liver. Prior to initiating therapy with Finide® 5 mg tablets, appropriate evaluation should be performed to identify other conditions such as infection, prostate cancer, stricture disease, hypotonic bladder or other neurogenic disorders that might mimic BPH. Physicians should instruct their patients to promptly report any changes in their breasts such as lumps, pain or nipple discharge. Breast changes including breast enlargement, tenderness and neoplasm have been reported. Physicians should inform patients that the volume of ejaculate may be decreased in some patients during treatment with Finide® 5mg tablets. This decrease does not appear to interfere with normal sexual function. However, impotence and decreased libido may occur in patients treated with Finide® 5 mg tablets. Taking Finasteride is associated with the risk of high-grade prostate cancer. Taking Finasteride has also been associated with the increased risk of depression and suicidal thoughts. Consult your doctor immediately if this side effect occurs.

#### Drug Interactions:

No drug interactions of clinical importance have been identified.

#### Pregnancy:

Pregnancy Category X. Finide® is not indicated for use in pregnant women.

#### Nursing Mothers:

Finide® is not indicated for use in women.

#### Pediatric Use:

Finide® is not indicated for use in pediatric patients.

#### Geriatric Use:

No dosage adjustment is necessary in the elderly.

#### Adverse reactions:

Finide® is generally well tolerated, adverse reactions usually have been mild and transient. The followings are the only clinical adverse reactions considered possibly: Impotence, Decreased libido, Decreased Volume of Ejaculatc, Ejaculation Disorder, Breast enlargement, Breast tenderness, Rash, Asthenia, Headache, Hypotension, Postural hypotension, Peripheral edema, Dizziness, Somnolence, Dyspnea, Rhinitis, Hypersensitivity reactions including pruritus, urticaria, and swelling of the lips and face, Testicular pain.

#### Dosage and administration:

- The recommended dosage for treatment of hair loss in mans is 1 mg orally once a day. In general, daily use for three months or more is necessary before benefit is observed. Continued use is recommended to sustain benefit, which should be re-evaluated periodically. Withdrawal of treatment leads to reversal of effect within 12 months.
- The recommended dose in the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia (BPH) in men is 5 mg orally once a day.
- Finide® 5 mg tablets can be administered alone or in combination with the alpha-blocker doxazosin.
- Finide® may be administered with or without meals.
- No dosage adjustment is necessary for patients with renal impairment or for the elderly.

#### Storage:

Store this drug below 30°C. Keep away from direct light and moisture. Keep away from reach of children.

#### Packaging:

- Finide® tablets are produced by Aburaihan pharmaceutical company in 5 & 1 mg doses.
- The 1 mg tablets are pale pink. 10 tablets are packed in one blister and three blisters with one leaflet are inserted in a cardboard box.
  - The 5mg tablets are blue. 10 tablets are packed in one blister and three blisters with one leaflet are inserted in a cardboard box.



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.

Manufactured by:  
**Aburaihan pharmaceutical Company, Tehran, IRAN**



**Aburaihan**  
Pharmaceutical Co.