

کابولین® ۵، ۰ میلی گرم

کابرگولین

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

ترکیب

هر قرص خط دار کابولین® حاوی ۵، ۰ میلی گرم کابرگولین می باشد.

دسته دارویی

پایین آورنده سطح پرولاکتین خون، آگونیست دوپامین

موارد مصرف

این دارو در مورد زیر مصرف می گردد.

درمان اختلال بالا بودن پرولاکتین خون ایدئوپاتیک یا ایجاد شده به وسیله آنوم هیپوفیز

راهنمایی های لازم برای بیمار

در موارد زیر پزشک معالج خود را در جریان قرار دهید:

به محض شک به بارداری، پزشک معالج خود را مطلع سازید.

به طور منظم پزشک معالج خود را ملاقات نمایید تا روند پیشرفت درمان را بررسی نماید.

به دلیل امکان ایجاد خواب آلودگی یا سرگیجه به هنگام رانندگی یا انجام اموری که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط نمایید.

در صورتی که مصرف یک نوبت دارو را فراموش نمودید و از زمان آن بیش از یک تا دو روز نگذشته است، به محض به خاطر آوردن، دارو را مصرف نمایید. اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، چنانچه دارو در حالت عادی به راحتی تحمل می گردد و حالت تهوع ایجاد نمی کند، مقدار مصرف بعدی را دو برابر نمایید، ولی اگر در حالت عادی دارو موجب ایجاد حالت تهوع می گردد قبل از مصرف دوز فراموش شده با پزشک معالج مشورت نمایید.

دارو را دقیقاً به مقدار تجویز شده مصرف نمایید و مقدار مصرف را افزایش یا کاهش ندهید.

از حالت نشسته یا دراز کشیده آهسته برخیزید تا کمتر دچار احساس سبکی سر یا سرگیجه گردید.

موارد منع مصرف

به جز در موارد خاص، مصرف این دارو در صورت وجود هم زمان مشکلات پزشکی زیر توصیه نمی گردد:

اکلامپسی، پره اکلامپسی و یا سابقه آن ها، فشار خون بالای کنترل نشده، اختلال شدید عملکرد کبد.

(به دلیل احتمال کاهش متابولیسم دارو، اگر کابولین® مصرف می گردد ممکن است نیاز به کاهش مقدار مصرف دارو وجود داشته باشد.)

در صورت وجود مشکلات پزشکی زیر، فواید دارو در مقابل مضراتش باید سنجیده شود:

اختلال خفیف تا متوسط عملکرد کبد (در این صورت ممکن است مقدار کمتر دارو نیاز باشد).

حساسیت به دارو یا مشتقات دیگر آلکالوئیدهای ارگو.

هشدار

چون کابرگولین به طور وسیع توسط کبد متابولیزه می گردد، در صورت تجویز دارو به بیماران دارای نارسایی کبدی، احتیاط به عمل آید و بیمار تحت نظر قرار گیرد.

موارد احتیاط

در موارد زیر با احتیاط تجویز گردد (فواید دارو در مقابل مضرات آن در نظر گرفته شود):

دوز شروع دارو اگر بیشتر از ۱ میلی گرم باشد ممکن است کاهش فشار خون وضعیتی ایجاد نماید. در صورتی که کابولین® با سایر داروهای کاهنده فشار خون تجویز شده است احتیاط به عمل آید.

این دارو برای مهار نمودن ترشح طبیعی شیر (پس از زایمان) مصرف نمی گردد.

تداخل دارویی

داروهای کاهنده فشار خون مانند متیل دوپا و رزریپین : مصرف هم زمان کابولین® با این داروها موجب تشدید اثر کاهش فشارخونی آنها می گردد و تعدیل دوز داروی کاهنده ی فشار خون ممکن است مورد نیاز باشد.

مهارکننده های دوپامین مانند متوکلوپرامید و یا داروهای نورولپتیک مانند هالوپریدول، فنوتیازین و تیوگزانتین زیرا ممکن است کابرگولین اثرات مهارکنندگی دوپامینی چنین داروهایی را مهار نماید و اثربخشی آنها

را کاهش دهد و شرایط موجود بیمار را تشدید نماید، تعدیل دوز هر دو ممکن است مورد نیاز باشد.

مصرف در جمعیت های خاص

بارداری و شیردهی: مصرف کابولین® در دوران بارداری توصیه نمی گردد. مطالعات کنترل شده و کافی در مورد مصرف دارو در زنان باردار موجود نیست. با وجود مطالعات بر حیوانات آزمایشگاهی، با توجه به آن که این مطالعات در مورد کابرگولین قابل تعمیم به انسان نیستند، دارو تنها در صورتی در دوران بارداری قابل استفاده است که به طور مشخص مورد نیاز باشد. تقسیم بندی اداره غذا و داروی آمریکا برای این دارو در دوران بارداری گروه B است. مشخص نشده است که آیا کابرگولین در شیر انسان ترشح می گردد. کابولین® نباید توسط مادران شیرده و یا مادرانی که قصد تغذیه نوزاد با شیر خود را دارند استفاده گردد زیرا دارو با مهار آزادسازی پرولاکتین تولید شیر را کاهش می دهد.

اطفال و سالمندان: مطالعات دقیق در مورد رابطه سن و اثرات کابرگولین در کودکان و سالمندان انجام نگرفته است. سلامت و کارایی دارو در این افراد به اثبات نرسیده است.

عوارض جانبی

آن دسته که نیاز به توجه پزشکی دارند.

با شیوع کم (۵ تا ۱۰٪): درد شکم، سرگیجه

نادر (۱٪): کاهش اشتها همراه با کاهش یا افزایش وزن، ورم دور چشم (تغییرات بینایی)، ورم محیطی (ورم دست ها، پا یا قوزک پا)، کاهش تمرکز، سنکوپ یا کاهش فشارخون (غش و یا احساس سبکی سر به هنگام برخاستن از حالت نشسته و یا دراز کشیده، گاهی اوقات ضربان قلب سریع)، به ویژه کاهش فشار خون وضعیتی.

آن دسته که فقط در صورت تداوم و یا ناراحت کننده بودن نیاز به توجه پزشکی دارند.

شایع: ضعف، یبوست، احساس گیجی، سوء هاضمه، سردرد، تهوع به ترتیب با شیوع ۶، ۷، ۱۷، ۴، ۲۶، ۲۹ درصد.

با شیوع کمتر (کمتر از ۳٪): اسهال، خشکی دهان، نفخ، سندرم شبه آنفولانزا، گرگرفتگی، بی خوابی و اختلال خواب، افسردگی، درد عضلات و مفاصل، خارش، دندان درد، استفراغ.

آن دسته که نیاز به توجه پزشکی ندارند

با شیوع کم (کمتر از ۱٪): آکنه، افزایش میل جنسی

مقدار مصرف

دوز معمول بزرگسالان و سالمندان:

به عنوان پایین آورنده پرولاکتین خون: ۲۵/۰ میلی گرم دو بار در هفته با توجه به سطح پرولاکتین خون بیمار، دوز دارو ممکن است به میزان ۲۵/۰ میلی گرم دو بار در هفته تا دستیابی به حداکثر ۱ میلی گرم دو بار در هفته افزایش یابد. افزایش دوز نباید سریعتر از هر ۴ هفته یک بار صورت گیرد. اگر پاسخ بیمار کافی نباشد و یا سودمندی بیشتری با دوز بالاتر مشاهده نگردد، پایین ترین دوز که حداکثر پاسخ درمانی را ایجاد می کند باید استفاده گردد و سایر درمان ها نیز مورد نظر قرار گیرد. پس از آن که ۶ ماه میزان هورمون پرولاکتین در حد طبیعی قرار گیرد، دارو ممکن است قطع شود. به طور دوره ای میزان پرولاکتین سرم کنترل می گردد تا مشخص گردد چه زمانی نیاز به درمان با کابولین® پیش خواهد آمد. تداوم کارایی کابولین® با درمان به مدت بیش از ۲۴ ماه به اثبات نرسیده است.

حداکثر دوز معمول بزرگسالان ۲ میلی گرم در هفته است.

شرایط نگهداری و نوع بسته بندی

دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

۸ عدد قرص کابولین® ۵/۰ میلی گرم درون شیشه قهوه ای رنگ همراه با ماده رطوبت گیر در یک جعبه عرضه می گردد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۱۵۵۵۴-۰۲۱ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران - ایران

ابوریحان
شرکت داروسازی
تهران - ایران



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

کابولین® ۱ میلی گرم

کابرگولین

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

ترکیب

هر قرص خط دار کابولین® حاوی ۱ میلی گرم کابرگولین می باشد.

موارد مصرف

درمان پارکینسون

موارد منع مصرف

حساسیت به هریک از آلکالوئیدهای ارگو

تداخلات دارویی

- تداخل دارویی خاصی بین کابرگولین با سایر داروهای مورد مصرف در درمان پارکینسون مانند لوودوپا، سلژیلین و یا حتی داروهایی که آگونیست دوپامین نمی باشند، مشاهده نگردیده است.
- از آنجایی که کابرگولین اثر دارویی خود را مستقیماً با تحریک گیرنده های دوپامینی اعمال می نماید تجویز هم زمان آن با آنتاگونیست های گیرنده های دوپامینی نظیر فنوتیازین ها، بوتیروفنون ها، تیوگزانتین ها و متوکلوپرامید توصیه نمی گردد.
- کابرگولین با آنتی بیوتیک های ماکرولیدی (همانند اریترومايسين) منع مصرف دارد زیرا این داروها موجب افزایش فراهمی زیستی و در نتیجه عوارض جانبی کابرگولین میگرددند.
- مصرف هم زمان کابرگولین با داروهای کاهنده فشار خون موجب افت شدید فشارخون و بروز عوارض جدی ناشی از آن می گردد.

بارداری و شیردهی

مطالعات حیوانی نشان داده اند که کابرگولین از جفت عبور می کند. در مورد انسان این موضوع ثابت نشده است. نتایج این مطالعات حاکی از آن است که این دارو فاقد اثرات تراتوژنیک در موش صحرایی و موش است. براساس نتایج برخی از مطالعات بالینی در زنان، باردار مصرف کابرگولین در دوران بارداری موجب افزایش خطر سقط، زایمان زودرس و یا اختلالات سیستم تناسلی نمی گردد به دلیل ناکافی بودن تجربیات کلینیکی و همچنین نیمه عمر طولانی کابرگولین توصیه میشود مصرف این دارو یک ماه پیش از اقدام به بارداری متوقف گردد. همچنین در صورت مطلع شدن از بارداری در طی درمان بلافاصله مصرف دارو را قطع نمایید.

در موش صحرایی، کابرگولین و متابولیت های آن در شیر ترشح می شود در مورد انسان این موضوع ثابت نشده است. این دارو به دلیل داشتن اثرات دوپامینرژیک موجب مهار ترشح شیر می گردد بنابراین با وجود عدم دسترسی به اطلاعات کافی در مورد انسان، به مادران توصیه می شود از شیر دادن نوزاد در طی درمان اجتناب ورزند.

عوارض جانبی

- سیستم عصبی: اختلالات حرکتی توهم و گیجی
- گوارشی: تهوع، استفراغ، سوءهاضمه و گاستریت.
- قلبی-عروقی: سرگیجه، کاهش فشار خون، انقباض عروق و ادم محیطی
- سایر موارد: التهاب های فیبروزی و سروزی و بروز خواب در طی فعالیت های روزانه (عوارض گوارشی بیشتر در زنان و عوارض عصبی بیشتر در افراد سالخورده مشاهده میگردد)

موارد هشدار

- به منظور افزایش پذیرش بیمار نسبت به اثرات دوپامینرژیک کابولین® این دارو را همراه غذا مصرف نمایید.
 - در صورت بروز اختلالات جدی عملکرد کبد، تعدیل دوز دارو الزامی است.
 - کابرگولین همانند سایر مشتقات ارگوت در مصرف طولانی مدت موجب بروز التهاب های فیبروتیک التهاب و فیبروز غشای ریه ها پریکاردیت و ... میگردد بنابراین در بیماران مبتلا به پارکینسون با سابقه چنین مواردی نباید تجویز شود مگر اینکه فواید استفاده از آن بر مضراتش ارجح باشد.
 - لزوم توجه به علائم و نشانه های زیر در طی درمان:
- بیماری های ریوی مانند دیس پنه، تنفس کوتاه، سرفه مقاوم و درد سینه
- نقص عملکرد کلیه ها یا انسداد عروق مثانه ای شکمی که با درد زیر شکم همراه است.
- اختلالات قلبی همانند فیبروز پریکارد
- (در صورت عدم رفع مشکلات فوق قطع مصرف کابرگولین توصیه میشود.)
- سایر بیماری ها نظیر سندروم رینود، زخم معده، خونریزی های گوارشی، سابقه ابتلا به بیماری های عصبی و روانی، کاهش فشار خون
- کابولین® در برخی بیماران موجب بروز خواب زودرس در طی فعالیت های روزانه گردیده است. بنابراین رعایت احتیاط در مواردی همانند رانندگی یا فعالیتهای نیازمند به هشیاری در طی درمان الزامی است.

مقدار مصرف معمول دارو

بزرگسالان: مقدار متوسط ۴ میلی گرم یک بار در روز (در برخی موارد تا ۶-۵ میلی گرم در روز قابل افزایش است.)

این دارو همراه با داروی لوودوپا/ کربی دوپا تجویز میگردد. مناسب ترین حالت آغاز درمان با دوز ۱ میلی گرم در روز و افزایش تدریجی آن در ادامه درمان می باشد. بدیهی است هم زمان با افزایش دوز کابولین® از میزان مصرف داروهای همراه همانند لوودوپا کاسته خواهد شد. این عمل تا رسیدن به وضعیت متعادل و نتیجه مطلوب درمان ادامه می یابد. به دلیل طولانی بودن طول عمر این دارو افزایش دوز آن به میزان ۱-۵، میلی گرم باید در طی یک هفته یا یک هفته در میان صورت پذیرد.

کودکان: اثربخشی و بی خطر بودن این دارو در کودکان به دلیل عدم ابتلای این گروه به بیماری پارکینسون، مورد بررسی قرار نگرفته است.

بسته بندی

۲۰ عدد قرص کابولین® ۱ میلی گرم درون شیشه قهوه ای رنگ همراه ماده رطوبت گیر در یک جعبه عرضه می گردد.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

مصرف کننده محترم از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند بخش علمی شرکت، با شماره تلفن ۰۲۱-۷۷۷۱۵۵۵۴۰ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر پاسخگوی سؤالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران - ایران

ابوریحان
شرکت داروسازی
تهران - ایران



Aburaihan
Pharmaceutical Co.