

مدروکسی پروژسترون استات

قرص ۵ میلی گرم

دسته دارویی:

پروژستین

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر نوع حساسیت دارویی
- هرگونه احتمال بارداری
- در صورت خونریزی غیر عادی و تشخیص داده نشده مهبل
- در صورت سابقه ناراحتی های شناخته شده یا مشکوک خونی و کبدی و سینه و دیابت و اختلالات کلیوی و آسم.

میزان مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیمار را پزشک معین می نماید، با این وجود میزان مصرف متعارف دارو در موارد توضیح داده شده به شرح زیر است:

- درمان فقدان قاعدگی ثانویه: میزان ۵ الی ۱۰ میلی گرم روزانه به مدت پنج الی ده روز که می توان مصرف آن را از هر زمان در طول دوره عادت ماهانه شروع کرد.
- درمان خونریزی فونکسینویل رحم: ۵ الی ۱۰ میلی گرم روزانه به مدت پنج الی ده روز که می توان مصرف آن را از روز شانزدهم تا بیست و یکم دوره عادت ماهانه شروع کرد.
- تحریک برای ایجاد عادت ماهانه: میزان ۱۰ میلی گرم روزانه به مدت پنج الی ده روز از روز شانزدهم الی بیست و یکم دوره عادت ماهانه.
- جایگزینی هورمون در دوران یائسگی: راه های درمانی متعددی وجود دارد که با نظر پزشک مشخص می گردد و یکی از راه های متعارف بدین قرار است:

۵ الی ۱۰ میلی گرم در روز قرص مدروکسی پروژسترون به مدت ده تا چهارده روز از روز دوازدهم یا شانزدهم عادت ماهانه مصرف شود.

داروی استروژنی از روز اول الی بیست و پنجم مصرف می گردد و از روز بیست و پنجم تا آخر ماه هیچ کدام از این دو دارو مصرف نمی گردد.

تذکر: خونریزی ۳ الی ۷ روز پس از قطع مصرف دارو بروز می کند.

عوارض جانبی شایع:

یک یا تعدادی از عوارض زیر با مصرف این دارو بسته به مدت و میزان مصرف ممکن است بروز نماید:

عوارض گوارشی، تغییر اشتها و وزن، احتباس آب و ادم، حساسیتهای پوستی، خواب

آلودگی و سر درد، افزایش حساسیت غیر طبیعی پستان به لمس و فشار، تغییر در

نظم خونریزی مهبل، کم بینی.

نکات قابل توصیه:

- مصرف مدروکسی پروژسترون در دوران بارداری توصیه نمی شود.
- دارو را هر روز در وقت صحیح و معین مصرف کنید.
- در صورت عدم تحمل گوارشی دارو، آن را بعد از غذا میل نمایید.
- در صورت تاخیر در قاعدگی یا بروز خونریزی غیر عادی، فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت مشکوک شدن به بارداری، مصرف دارو را فوراً قطع نمایید و به پزشک مراجعه نمایید.
- برای بررسی پیشرفت درمان، مراجعه به پزشک الزامی است.
- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را میل کنید، ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی دارو فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف کرده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

نوع بسته بندی:

یک بسته شامل صد عدد قرص مدروکسی پروژسترون (در ده بلیستر ده عددی) است که هر قرص حاوی ۵ میلی گرم مدروکسی پروژسترون استات می باشد.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و در محلی خشک و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- تا موقع مصرف دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

