



راکانیل ۲۰۰

قرص روکش دار خط دار هیدروکسی کلروکین سولفات

مشخصات دارو

هر قرص راکانیل حاوی ۲۰۰ میلی گرم هیدروکسی کلروکین سولفات به عنوان ماده موثره می باشد.

دسته دارویی

ضد مالاریا، ضد روماتیسم

موارد مصرف

- آرتریت روماتوئید (التهاب مفاصل)
- آرتریت ایدئوپاتیک جوانی (در کودکان)
- لوپوس اریتماتوز دیسکوئید و سیستمیک (بیماری مزمن پوستی)
- مشکلات پوستی که به نور خورشید حساس هستند.

موارد منع مصرف

- در صورت وجود هر یک از موارد زیر، این دارو منع مصرف دارد:
- اگر نسبت به هیدروکسی کلروکین یا سایر داروهای مشابه مانند کینولون و کینین حساسیت دارید.
- اگر مشکل چشمی دارید که روی شبکه و قسمت داخلی چشم تأثیر می گذارد و یا تغییر رنگ چشم یا هر نوع مشکل چشم دیگر

بارداری و شیردهی

- مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود. اگر متوجه شدید که باردار هستید یا قصد بارداری دارید، سریعاً با پزشک خود مشورت کنید.
- اگر شیرده هستید یا قصد شیردهی دارید، از مصرف هیدروکسی کلروکین سولفات اجتناب نمایید. مقدار کمی از دارو ممکن است به شیر مادر منتقل شود. در صورت بارداری یا شیردهی، قبل از مصرف هرگونه دارویی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

موارد هشدار و احتیاط

- قبل از مصرف هیدروکسی کلروکین سولفات با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید اگر:
- مشکلات کبدی یا کلیوی دارید.
- مشکلات جدی معده یا روده دارید.
- مشکلات قلبی دارید.
- مشکل خونی دارید. برای بررسی این موضوع ممکن است نیاز به انجام آزمایش خون باشد.
- مشکل سیستم عصبی یا مغزی دارید.
- پسوریازیس دارید (لکه های قرمز پوستی که معمولاً روی زانو، آرنج و پوست سر تأثیر می گذارد).
- سابقه حساسیت نسبت به کینین ها داشته اید.
- مبتلا به بیماری ژنتیکی "کمبود گلوکز-۶ فسفات دهیدروژناز" هستید.
- مبتلا به بیماری نادر "پورفیری" هستید که بر متابولیسم شما تأثیر می گذارد.
- قبل از درمان با هیدروکسی کلروکین سولفات چه نکاتی مهم است:
- قبل از مصرف این دارو باید معاینه چشم انجام شود.
- این آزمایش باید حداقل هر ۱۲ ماه و در مدت زمان مصرف هیدروکسی کلروکین سولفات، تکرار شود.
- اگر بالای ۶۵ سال دارید، نیاز به مصرف دوز بالا دارید (۲ قرص در روز) یا مشکلات کلیوی دارید، این معاینه باید بیشتر انجام شود.
- هیدروکسی کلروکین می تواند باعث کاهش سطح قند خون شود. از پزشک خود بخواهید که شما را از علائم و نشانه های قند خون پایین آگاه کند. بررسی سطح قند خون ممکن است در طول مدت درمان لازم باشد.
- در طول درمان با هیدروکسی کلروکین سولفات رعایت چه نکاتی مهم است:
- از بیمار در مورد علائم بینایی سؤال کنید و هر ساله با استفاده از نمودار استاندارد خواندن، میزان بینایی را بسنجید.
- در صورت تغییر در بینایی یا تاری دید، به پزشک معالج مراجعه کنید و به بیمار هشدار دهید که در مورد قطع درمان نیاز به تجویز پزشک می باشد.
- در صورت نیاز به درمان طولانی مدت (بیش از ۵ سال)، باید تحت نظر پزشک متخصص باشید.

تداخلات دارویی

برخی از آنتی بیوتیک ها (مانند جنتامایسین، نفوماکسیل و توبراماکسیل)، سایمتیدین، نئوستیگمین و پیریدوستیگمین، مفلوکین، پرازیکوانتل، آمیودارون، دیگوکسین، موکسیفلوکساسین، داروهای ضد تشنج، داروهای ضد دیابت (مانند انسولین یا متفورمین)، آنتی اسیدها (باید بین مصرف این داروها و هیدروکسی کلروکین سولفات حداقل ۴ ساعت فاصله باشد)، واکسن هاری، سیکلوسپورین.

مقدار و نحوه مصرف دارو

همیشه دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید. اگر مطمئن نیستید باید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. دارو را همراه با وعده غذایی یا یک لیوان شیر میل کنید. از خرد کردن یا جویدن قرص خودداری نمایید.

بزرگسالان

۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم روزانه. حداکثر دوز روزانه بر اساس وزن ایده آل بدن می باشد. و به صورت ۵/۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. ممکن است چندین هفته تا شروع اثرات هیدروکسی کلروکین سولفات، طول بکشد.

- اگر مصرف هیدروکسی کلروکین سولفات را فراموش کردید:

اگر یک دوز را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. با این حال، اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی است، دوز از دست رفته را استفاده نکنید و برای جبران قرص فراموش شده، دوز مصرف را دو برابر نکنید.

- مصرف بیش از حد:

مصرف بیش از حد هیدروکسی کلروکین بسیار خطرناک و درمان آن دشوار است. پیامد هایی مانند آریتمی که می تواند شروع خیلی سریع داشته باشد و تشنج به دنبال دارد.

عوارض جانبی

اگر هر یک از عوارض جانبی زیر بروز یابد و بیش از چند روز طول بکشد، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

- عوارض جانبی شایع یا بسیار شایع:

درد شکم، کاهش اشتها، اسهال، عدم ثبات عاطفی، سردرد، حالت تهوع، واکنش پوستی، اختلالات بینایی، استفراغ

- عوارض جانبی غیر شایع:

آلوپسی، ورم قرنیه، خواب آلودگی، اختلالات چشم، تغییر رنگ مو، اختلال شنوایی، پر خاشگری، رتینوپاتی، تشنج، سرگیجه

- نادر یا بسیار نادر:

نارسایی حاد کبدی، آگرانولوسیتوز، کم خونی، آنژیوادم، اختلالات مغز استخوان، برونکواسپاسم، اختلالات قلبی، کاردیومیوپاتی، هیپوگلیسمی، لوکوپنی، اختلالات حرکتی، ضعف عضلانی، میوپاتی، حساسیت به نور، روان پریشی، عوارض پوستی شدید، ترومبوسیتوپنی، لرزش، هیپرتروپی بطنی.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران-ایران



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

RACANIL 200

Hydroxychloroquine sulfate Scored F.C Tablet



Description

Each Racanil tablet contains 200 mg hydroxychloroquine sulfate as active ingredient.

Category

Antimalarial quinolines
Antirheumatics

Indications

- Rheumatoid arthritis (inflammation of the joints)
- Juvenile idiopathic arthritis (in children)
- Discoid and systemic lupus erythematosus (a disease of the skin or the internal organs)
- Skin problems which are sensitive to sunlight

Contraindications

Do not take hydroxychloroquine sulfate if:

You are allergic (hypersensitive) to Hydroxychloroquine, other similar medicines such as quinolones and quinine.

You have an eye problem which affects the retina, the inside of the eye (maculopathy) or you get a change in eye colour or any other eye problem.

Pregnancy and Breastfeeding

Use of this medicine is not recommended during pregnancy. If you discover that you are pregnant or are planning to have a baby, consult your doctor right away to re-assess the need for treatment.

Do not take hydroxychloroquine sulfate if you are breast-feeding or planning to breast-feed. This is because small amounts may pass into mother's milk. Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine if you are pregnant or breast-feeding.

Warnings and Precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking hydroxychloroquine sulfate if:

- You have liver or kidney problems.
- You have serious stomach or gut problems.
- You have heart problems.
- You have any problems with your blood. You may have blood tests to check this.
- You have any problems with your nervous system or brain.
- You have psoriasis (red scaly patches on the skin usually affecting the knees, elbows and scalp).
- You have had a bad reaction to quinine in the past.
- You have a genetic condition known as 'glucose-6-dehydrogenase deficiency'.
- You have a rare illness called 'porphyria' which affects your metabolism.

Before treatment with hydroxychloroquine sulfate

- Before you take this medicine you should have your eyes examined.
- This testing should be repeated at least every 12 months whilst taking hydroxychloroquine sulfate.
- If you are over 65, need to take a high dose (2 tablets a day) or have kidney problems then this examination should be performed more often.

Hydroxychloroquine can cause lowering of blood glucose level. Please ask your doctor to inform you of signs and symptoms of low blood glucose levels. A check of the blood glucose level may be necessary.

During treatment with hydroxychloroquine sulfate

- Ask patient about visual symptoms and monitor visual acuity annually using the standard reading chart.
- Refer to ophthalmologist if visual acuity changes or if vision blurred and warn patient to seek prescribing doctor's advice about stopping treatment.
- If long-term treatment is required (more than 5 years), individual arrangement should be agreed with the local ophthalmologist.

Interactions

Some antibiotics (such as gentamicin, neomycin or tobramycin), Cimetidine, Neostigmine and pyridostigmine, Mefloquine, Praziquantel, Amiodarone, Digoxin, Moxifloxacin, Antiepileptics, Antidiabetic drugs (such as insulin or metformin), Antacids. (You should leave a gap of at least 4 hours between taking these medicines and hydroxychloroquine sulfate), Rabies vaccine, Cyclosporin.

Dosage & Administration

Always take hydroxychloroquine sulfate exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. Take this medicine by mouth. Swallow the tablets whole with a meal or a glass of milk. Do not crush or chew your tablets.

Adults (including the elderly)

200–400 mg daily, daily maximum dose to be based on ideal body-weight; maximum 6.5 mg/kg per day. It may take several weeks before you notice the benefit of taking hydroxychloroquine sulfate.

If you forget to take hydroxychloroquine sulfate

If you forget a dose, take it as soon as you remember it. However, if it is nearly time for the next dose, skip the missed dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

Overdose

Hydroxychloroquine is very toxic in overdosage; overdosage is extremely hazardous and difficult to treat. Life-threatening features include arrhythmias (which can have a very rapid onset) and convulsions (which can be intractable).

Adverse effects

Tell your doctor or pharmacist if any of the following side effects get serious or lasts longer than a few days: Common or very common side effects

Abdominal pain, appetite decreased, diarrhoea, emotional lability, headache, nausea, skin reactions, vision disorders, vomiting.

Uncommon side effects

Alopecia, corneal oedema, dizziness, eye disorders, hair colour changes, hearing impairment, nervousness, retinopathy, seizure, vertigo.

Rare or very rare

Acute hepatic failure, agranulocytosis, anaemia, angioedema, bone marrow disorders, bronchospasm, cardiac conduction disorders, cardiomyopathy, hypoglycaemia, leucopenia, movement disorders, muscle weakness, myopathy, photosensitivity reaction, psychosis, reflexes absent, severe cutaneous adverse reactions (SCARs), thrombocytopenia, tremor, ventricular hypertrophy

Storage

Store below 30° C and protect from light and moisture.
Keep out of the sight and reach of children.



Manufactured by **Aburaihan** Pharma.Co.
Tehran-Iran



Aburaihan
Pharmaceutical Co.