

اکسی توسین تزریقی

آمپول های ۵ و ۱۰ واحد در میلی لیتر

راهنمایی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

• قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- سابقه حساسیت به اکسی توسین

- سابقه بیماری قلبی، بالا بودن فشار خون و یا نارسایی کلیه

میزان و نحوه مصرف دارو:

مصرف این دارو تحت نظر مستقیم پزشک و در مراکز درمانی باید انجام پذیرد و پزشک معالج بسته به نوع تشخیص و میزان دارو، طریقه مصرف را مشخص می نماید. این دارو را می توان در مواردی چون القای زایمان، تسریع زایمان، کاهش خونریزی بعد از زایمان (پس از خروج جفت) و برای بررسی زجر تنفسی جنین بعد از هفته سی و یکم استفاده نمود. این دارو در اکثر موارد به صورت وریدی، رقیق شده و انفوزیون آهسته مصرف می گردد.

• برای القا و یا تسریع زایمان به صورت انفوزیون وریدی: ابتدا به میزان ۵/۰ الی ۲ میلی واحد در دقیقه که هر ۱۵ دقیقه تا یک ساعت می توان ۱ الی ۲ میلی واحد در دقیقه به میزان دارو افزود تا نتیجه حاصل گردد (حداکثر تا ۲۰ میلی واحد در دقیقه) با برقراری روند زایمان سرعت انفوزیون کاهش می یابد.

• کاهش خونریزی بعد از زایمان پس از خروج جفت: انفوزیون وریدی ۱۰ واحد اکسی توسین با سرعت ۲۰ الی ۴۰ میلی واحد در دقیقه جهت خروج نوزاد و ترجیحاً جفت و یا تزریق عضلانی

۱۰ واحد اکسی توسین برای خروج جفت.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه غالب اوقات همه این اثرات جانبی ظاهر نمی شوند.

عوارض جانبی که در مادر ممکن است بروز نمایند:

مسمومیت با آب (علائمی چون تشنج، کما، گیجی، سردرد مزمن، افزایش و یا کاهش وزن) افزایش و یا تداوم خونریزی واژینال، جوش صورت یا خارش یا کپیر، ضربان قلب سریع و نامنظم، درد شکمی یا رحمی.

• با قطع مصرف دارو (انفوزیون دارو) عوارض دارو کم خواهد شد.

نکات قابل توصیه:

• استفاده از این دارو در مراکز درمانی و تحت نظر پزشک معالج امکان پذیر است.

• این دارو باید انفوزیون وریدی گردد. از تزریق وریدی آن به صورت حمله ای خودداری گردد و فقط در مورد کنترل خونریزی پس از زایمان است که می توان عضلانی نیز تزریق نمود.

• در موارد وضعیت نامناسب جنینی، حاملگی های چند قلو و تعدد زایمان نیاز به مراقب های پزشکی بیشتری هنگام استفاده از دارو است.

• در صورت تغییر رنگ یا ایجاد رسوب از تزریق دارو خودداری نمایید.

• مصرف این دارو جهت القای زایمان تنها در شرایطی که فوریت پزشکی برای القای زایمان وجود دارد باید صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

• دارو را در دمای بین ۸- ۲ سانتی گراد، درون جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

• داروی فوق فرآورده سنتتیک می باشد و منشأ حیوانی ندارد.

