

پردنیزولون

قرص خط دار ۵ و ۵۰ میلی گرم

مشخصات دارو:

پردنیزولون از دسته ی دارویی کورتیکواستروئیدهاست که به شکل طبیعی در بدن وجود دارند. پردنیزولون از آزاد شدن موادی که می توانند باعث التهاب شوند جلوگیری می کند.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. پردنیزولون در طیف گسترده ای از بیماری های التهابی و خود ایمنی مورد مصرف قرار می گیرد، از جمله آلرژی ها، بیماری های پوستی، بیماری های التهابی روده، آرتریت، لوپوس و بیماری های تنفسی

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
- دارو را به همراه غذا مصرف نمایید.
- از قطع ناگهانی پردنیزولون خودداری کنید، زیرا دوز دارو باید به تدریج کاهش یافته و سپس قطع شود.
- دوز پردنیزولون بر اساس نوع بیماری، توسط پزشک شما تعیین می شود.
- دوز شروع این دارو برای بیماری های مختلف معمولاً بین ۵-۶۰ میلی گرم است.
- دوز نگهدارنده ی پردنیزولون با توجه به پاسخ بیمار به دارو متفاوت خواهد بود.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به این دارو و سایر کورتیکواستروئیدها و وجود عفونتهای قارچی سیستمیک از مصرف دارو خودداری نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

استروئیدها از جمله پردنیزولون می توانند باعث تضعیف سیستم ایمنی شوند. در صورت ابتلا به بیماری یا وجود هرگونه عفونت قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید. بیمارانی که این دارو را بعنوان سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند بیشتر مستعد ابتلا به عفونت هستند لذا باید از زدن واکسنهای حاوی ویروس یا باکتری زنده مانند سرخک، سرخچه، آبله مرغان و سایر سرکوب کننده های سیستم ایمنی اجتناب کنند (حتی در معرض افراد مبتلا به این بیماری ها هم قرار نگیرند). در صورت مصرف طولانی مدت این دارو وضعیت چشمها به شکل دوره ای معاینه شود، زیرا این دارو می تواند موجب عوارض چشمی چون آب مروارید و گلوکوم شود. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در بینایی، با پزشک خود مشورت کنید. به خاطر داشته باشید که مصرف طولانی مدت کورتون ها از قبیل این دارو افراد را مستعد پوکی استخوان می نماید، بنابراین مصرف کلسیم و ویتامین D همراه این دارو توصیه می شود.

بارداری و شیردهی:

در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید. مصرف قرص پردنیزولون در دوران بارداری تنها در صورتی مجاز است که مزیت این دارو نسبت به ریسک خطرات مصرف آن قابل توجه باشد. مصرف پردنیزولون در شیردهی با احتیاط صورت گیرد زیرا می تواند در شیر مادر ترشح شود. از مصرف این دارو تا ۴ ساعت قبل از شیردهی خودداری کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید. این تداخلات می تواند شامل داروهای ذیل باشد:

آمفو تریسین B

سیکلوسپورین

دیگوکسین

داروهای ضد تشنج (مانند باربیتورات ها، فنی توئین، پریمیدون، کاربامازپین)

داروهای ضد سل (مانند ریفامپین)

داروهای ضد هپاتیت C و ایدز (نویراپین، افویرنز، ریتوناویر و نلفیناویر)

داروهای ضد قارچ (کتوکونازول، ایتراکونازول) و آنتی بیوتیک ها (مانند اریترومايسين)

داروهای ضد بارداری

داروهای ضد انعقاد خون

داروهای کاهنده ی قند خون و انسولین

عوارض جانبی:

مانند همه ی داروهای دیگر، پردنیزولون می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند.

عوارض جانبی شایع این دارو شامل:

بیخوابی، تغییر خلق و خو، افزایش اشتها و افزایش تدریجی وزن، جوش، خشکی و نازک شدن پوست، افزایش تعریق، تاخیر در بهبودی زخم ها، تهوع، نفخ، دل درد، تغییر در پراکندگی توده های چربی بدن (به خصوص در صورت، پا، گردن و کمر)، گلوکوم، آب مروارید، تاری دید و سرور رتینوپاتی مرکزی، سندرم کوشینگ، رشد مو زائد، شوک آنافیلاکسی، آنژیوادم، بروز لک های روشن یا تیره از پوست، میوپاتی، پوکی استخوان، سرکوب ایمنی، احتباس مایعات و افزایش فشار خون

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور درون جعبه نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

