

ترانگزامیک اسید ۲۵۰

کپسول خوراکی ۲۵۰ میلی گرم

مشخصات دارو

کپسول های ترانگزامیک اسید حاوی ۲۵۰ میلی گرم ماده موثره می باشند.

دسته دارویی

ضد فیبرینولیز - بند آورنده خون

موارد مصرف

این دارو در افراد با نوع خاصی از اختلالات خونریزی (هموفیلی) برای جلوگیری و کاهش خونریزی ناشی از کشیدن دندان استفاده می شود. همچنین برای کنترل خونریزی در مواردی مانند بعد از عمل جراحی یا آسیب در هنگام خونریزی بینی و یا خونریزی شدید قاعدگی استفاده می شود.

موارد منع مصرف

- حساسیت به ترانگزامیک اسید یا هر یک از مواد جانبی محصول
- بیماریهای ترومبوآمبولیک مانند ترومبوز وریدی عمقی، آمبولی ریوی و ترومبوز مغزی.
- اختلالات کلیوی (دارو ممکن است تجمع یابد).
- لخته درون عروقی فعال
- سابقه تشنج
- اختلالات اکتسابی در بینایی رنگها

بارداری و شیردهی

در دوران بارداری، این دارو باید تنها زمانی استفاده گردد که مورد نیاز باشد. در مورد خطرات و مزایای دارو با پزشک خود مشورت کنید.
این دارو به شیر مادر منتقل می شود. قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.

موارد هشدار و احتیاط

قبل از مصرف ترانگزامیک اسید، در صورت سابقه حساسیت یا آلرژی به دارو، با پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید. قبل از استفاده از این دارو، اگر شرایط خاص پزشکی دارید، مانند وجود لخته های خون (در پاها، ریه ها، مغز، چشم)، خونریزی مغزی، اختلالات بینایی، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید قبل از استفاده از این دارو، پزشک یا داروساز را از سابقه پزشکی خود به خصوص سابقه لخته خون، بیماری خاص لخته شدن خون (انعقاد منتشره داخل عروقی (DIC))، مشکلات کلیه (از جمله خون در ادرار)، خونریزی نامنظم قاعدگی، آگاه نمایید.
این دارو ممکن است باعث سرگیجه شما شود. از رانندگی و یا فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری دارند اجتناب کنید.

- به دلیل دفع کلیوی این دارو، در افراد مسن بهتراست با احتیاط مصرف شود.

تداخلات دارویی

- داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، هپارین
- مصرف همزمان با کمپلکس ضد مهار انعقادی یا فاکتور IX کمپلکس ممکن است خطر بروز عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.
- داروهای جلوگیری از بارداری حاوی استروژن (مانند قرص، پیچ، حلقه).
- داروهای NSAIDs (مانند آسپرین، ایبوپروفن، ناپروکسن)، ممکن است خطر خونریزی را افزایش دهند.

مقدار و نحوه مصرف دارو

این دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید. معمولاً ۲ تا ۴ بار در روز و تحت نظر پزشک خود مصرف کنید. دوز و طول درمان به وضعیت پزشکی شما و پاسخ به درمان بستگی دارد. دوز بر اساس وزن شماست. دوز خود را بدون نظر پزشک افزایش ندهید، و آن را برای مدت زمان طولانی تر از زمان تجویز شده مصرف نکنید. دارو را در ساعت خاص مصرف نمایید. اگر وضعیت شما همچنان ادامه داشت یا بدتر شد، با پزشک خود مشورت کنید.

دوز فراموش شده: در صورت فراموش نمودن یک دوز، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. اگر نزدیک به زمان مصرف دوز بعدی باشد، از دوبرابر نمودن دوز خودداری نمایید و به روند درمانی خود ادامه دهید.

عوارض جانبی

مانند سایر داروها، این دارو نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه ممکن است در همه افراد یکسان بروز نکند.
تهوع، استفراغ، اسهال، یا سرگیجه ممکن است رخ دهد. اگر هر یک از این عوارض همچنان ادامه داشته باشد یا بدتر شود، به سرعت به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
اگر هر یک از این عوارض جانبی جدی، بروز کردند به پزشک خود اطلاع دهید. از جمله: مشکلات چشم و پلک، درد در ناحیه سینه، فک، دست چپ، تنگی نفس ناگهانی، سرفه خونی، غش کردن، درد، تورم، گرما در کشاله ران، تورم، ضعف، قرمزی، درد در ناحیه دست و پاها، سردرگمی، بی حسی، ضعف در یک طرف بدن، تغییرات دید (به عنوان مثال تغییرات در دیدن رنگ ها، از دست دادن بینایی)، تغییر مقدار ادرار. واکنش حساسیت و آلرژی به این دارو نادر است. اما اگر متوجه علائم واکنش شدید آلرژیک شدید، از جمله: خارش، تورم (به خصوص صورت، زبان و گلو)، سرگیجه شدید، مشکل تنفس به پزشک متخصص مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



Tranexamic acid 250

Capsule 250 mg

Description

Tranexamic acid capsules are available containing 250 mg tranexamic acid.

Category

Anti-fibrinolytics

Indications

This medication is used short-term in people with a certain type of bleeding disorder (hemophilia) to prevent and reduce bleeding from having a tooth pulled (extraction). It is also used in people with other high-risk bleeding conditions to control bleeding at such times as after surgery or an injury, during heavy nosebleeds, or during heavy menstrual bleeding.

Contraindications

Tranexamic acid is contraindicated in patients with:

- Known hypersensitivity to tranexamic acid or to any of the excipient of the product.
- Acute thromboembolic disease such as deep vein thrombosis, pulmonary embolism and cerebral thrombosis.
- Severe renal impairment (risk of accumulation).
- Active intravascular clotting.
- History of convulsions.
- Acquired disturbances of color vision.

Pregnancy & Breast-feeding

During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed. Discuss the risks and benefits with your doctor.

This drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

Warnings & Precautions:

- Before taking tranexamic acid, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies.
- This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: current blood clots (e.g., in the legs, lungs, brain, eye), bleeding in the brain (subarachnoid hemorrhage), color vision problems.
- Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: history of blood clots, a certain serious blood clotting problem (disseminated intravascular coagulation-DIC), kidney problems (including blood in the urine), irregular menstrual bleeding of unknown cause.
- This drug may make you dizzy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are sure you can perform such activities safely.
- This medication is removed by the kidneys. Therefore, the elderly may be more sensitive to the effects of this drug.

Drug Interactions

Anticoagulants such as warfarin, heparin

Drugs that prevent bleeding (including factor IX complex, anti-inhibitor coagulant concentrates, aminocaproic acid)

Estrogens, hormonal birth control (such as pills, patch, ring).

Check all prescription and nonprescription medicine labels carefully since many medications contain pain relievers/fever reducers (NSAIDs such as aspirin, ibuprofen, naproxen) that may increase your risk of bleeding.

Dosage & Administration

Take this medication by mouth, usually 2 to 4 times daily or as directed by your doctor. The dosage and length of treatment is based on your medical condition and response to treatment. Dosage is also based on your weight. Do not increase your dose, take it more frequently, or take it for a longer time than prescribed. Take this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same times each day. Tell your doctor if your condition persists or worsens.

Missed Dose: If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

Adverse effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Nausea, vomiting, diarrhea, or dizziness may occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: eye/eyelid problems.

Although unlikely, this medication may cause serious blood clot problems and vision changes.

Seek immediate medical attention if any of these unlikely but serious side effects occur: chest/jaw/left arm pain, sudden shortness of breath, coughing up blood, fainting, pain/swelling/warmth in the groin/calf, swelling/weakness/redness/pain in the arms/legs, confusion, slurred speech, weakness on one side of the body, vision changes (e.g., color vision changes, loss of vision), change in the amount of urine. A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

Storage

Store below 30° C, protect from light and moisture.

Keep out of reach of children.



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

Manufactured by Aburaihan Pharma. Co.
Tehran-Iran



Aburaihan
Pharmaceutical Co.