

قرص خط دار فلودروکورتیزون ۰/۱ میلی گرم

دسته دارویی:

گلوکوکورتیکوئید، مینرالوکورتیکوئید

هشدارها و احتیاطات:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- فشار خون، نارسایی احتقانی قلب یا بیماری قلبی دیگر. در صورت افزایش قابل توجه وزن بدن یا فشار خون، بروز خیز (ورم) یا بزرگ شدن قلب باید مصرف دارو قطع شود.

۲- مصرف فلودروکورتیزون در موارد نارسایی غده فوق کلیوی یا سندرم همراه با از دست دادن املاح باید با تجویز مقادیر کافی گلوکوکورتیکوئید همراه باشد.

۳- افراد مبتلا به بیماری آدیسون نسبت به اثر فلودروکورتیزون حساس تر هستند و ممکن است دچار عوارض جانبی شدیدی شوند. در صورت افزایش قابل توجه وزن بدن یا فشار خون، بروز خیز (ورم) یا بزرگ شدن قلب باید مصرف دارو طبق نظر پزشک قطع شود.

۴- احتباس سدیم و از دست دادن پتاسیم ممکن است با مصرف مقادیر زیاد سدیم تسریع شود. در صورت بروز خیز (ورم) ممکن است محدود کردن مصرف سدیم و استفاده از مکمل های پتاسیم ضروری باشد.

۵- مصرف همزمان با باربیتوراتها، فنی توئین یا ریفامپین ممکن است به دلیل افزایش متابولیسم کبدی فلودروکورتیزون، موجب کاهش اثرات کورتیکواستروئیدی این دارو شود.

۶- فلودروکورتیزون ممکن است کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف داروهای مدر یا آمفوتریسین B را تشدید کند. کاهش پتاسیم خون ممکن است خطر مسمومیت را در بیماران که گلیکوزیدهای دیژیتال مصرف می کنند، تشدید کند. این دارو ممکن است متابولیسم ایزونیازید و سالیسیلاتها را افزایش دهد. توجه: قطع ناگهانی مصرف دارو می تواند مرگ آور باشد یا ممکن است بیماری های زمینه ای را تشدید کند.

عوارض جانبی:

درد در ناحیه پیشانی و پس سری و سرگیجه، احتباس سدیم و آب (که ممکن است به افزایش حجم خون، خیز (ورم)، افزایش فشار خون، آریتمی قلبی و بزرگ شدن قلب منجر شود)، کاهش پتاسیم خون، افزایش غیرطبیعی وزن بدن، درد مفاصل و کشش تاندون ها، ضعف شدید اندامهای انتهایی همراه با فلج بالارونده ناشی از کاهش پتاسیم خون، آب مروارید، گلوکوم، سندرم کوشینگ، هیرسوتیسم، افزایش قند خون، آکنه، هذیان، نارسایی قلبی، تشنج، حساسیت به دارو (شوک آنافیلاکسی)، مشکلات قاعدگی و راش پوستی. تاری دید و سروررتینوپاتی مرکزی در صورت مشاهده هرگونه تغییر در بینایی، با پزشک خود مشورت کنید.

بارداری:

مصرف کورتیکواستروئیدها در طول بارداری توصیه نمی شود مگر به دستور پزشک.

مصرف در کودکان:

مصرف طولانی مدت آدرنوکورتیکوئیدها یا کورتیکوتروپین ممکن است موجب مهار رشد و بلوغ در کودکان و نوجوانان شود.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و داخل جعبه نگهداری شود.

مصرف کننده محترم: از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن: ۰۲۱-۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

