



آ.ش.آ

استامینوفن ۱۶۲.۵ میلی گرم/گرم/کافئین ۳۲.۵ میلی گرم / آسپیرین ۳۲۵ میلی گرم قرص دولایه

مشخصات دارو:

استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین به صورت قرص های دولایه می باشد. هر قرص حاوی ۱۶۲/۵ میلی گرم استامینوفن، ۳۲/۵ میلی گرم کافئین و ۳۲۵ میلی گرم آسپیرین بوده و به صورت خوراکی قابل استفاده می باشد.

دسته دارویی:

ضد درد

موارد مصرف:

استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین برای درمان سردرد و حملات میگرنی همراه یا بدون اورا، استفاده می شود.

موارد منع مصرف:

مانند همه داروها، قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین نیز نباید در برخی شرایط استفاده شود، که عبارتند از:

- حساسیت به استامینوفن، کافئین، آسپیرین یا سایر ترکیبات تشکیل دهنده ی این دارو
- داشتن سابقه حساسیت به سایر داروهای مورد استفاده برای درمان درد، تب یا التهاب، شامل سالیسیلات ها یا داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی مثل ایبوپروفن و دیکلوفناک
- ابتلای قلبی و یا داشتن سابقه ابتلا به زخم معده و روده
- مشاهده خون در مدفوع و یا سیاه رنگ بودن مدفوع
- ابتلا به اختلالات خونی
- ابتلا به مشکلات شدید قلبی، کلیوی و کبدی
- مصرف بیش از ۱۵ میلی گرم متوتروکسات در هفته
- سه ماهه سوم بارداری
- کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که دارای علائم عفونت های ویروسی نظیر آنفولانزا یا آبله مرغان بوده و یا در حال گذراندن دوره نقاهت این بیماری می باشند.

بارداری و شیردهی:

اگر فکر می کنید باردار هستید، می خواهید باردار شوید، یا به نوزاد خود شیر میدهید، باید پزشک خود را در جریان بگذارید.

بازداری

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شده، به ویژه در طول سه ماهه سوم بارداری، زیرا مصرف آن می تواند برای جنین آسیب زا باشد یا در زایمان اختلال ایجاد کند.

شیردهی

مصرف قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین در دوران شیردهی ممکن است برای نوزاد آسیب زا باشد، لذا از مصرف آن در این دوران خودداری کنید.

موارد هشدار و احتیاط:

قبل از مصرف قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین، در خصوص موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

- عدم سابقه پزشکی میگرن، زیرا لازم است پیش از درمان، شرایط به طور کامل بررسی شده و احتمال بروز مشکلات جدی مغز و اعصاب بررسی شوند.
- اگر سردردی با الگوی متفاوت از میگرن معمول خود داشته باشید ، یا اگر سردرد میگرنی شما با استفراغ همراه باشد.
- سردرد به دنبال آسیب به سر، اعمال زور، سرفه یا خم شدن ایجاد شده باشد.

داشتن سردرد مزمن (تداوم سردرد به مدت ۱۵ روز یا بیشتر در ماه برای بیش از سه ماه)، یا تجربه اولین سردرد در سنین بالای پنجاه سال

داشتن مشکلات کبدی ،کلیوی و یا عفونت شدید

کمبود وزن و سوء تغذیه شدید، و یا مصرف مداوم الکل، زیرا می تواند موجب افزایش خطر اسیدوز متابولیک شود.

ابتلا به فلوئسم (بیماری ارثی نقص آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز)

داشتن سابقه ابتلا به مشکلات دستگاه گوارش نظیر زخم معده، خونریزی و مدفوع سیاه رنگ و یا سابقه بروز ناراحتی و سوزش معده به دنبال مصرف داروهای مسکن و ضدالتهاب

ابتلا به اختلالات خونریزی یا خونریزی غیرطبیعی واژن مثل دوران قاعدگی طولانی و سنگین

اخیراً تحت هرگونه عمل جراحی قرار گرفتن و یا داشتن عمل جراحی طی ۷ روز آینده

دچار بودن به اسم، تب، یبوست، بولیم، یبمی، بیماری های مزمن تنفسی یا واکنش شدید حساسیتی

ابتلا به نفرس، دیابت، پرکاری تیروئید، آریتمی قلبی و فشارخون کنترل نشده

مصرف همزمان سایر فرآورده های حاوی استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) و استامینوفن

دهیدراته شدن (به عنوان مثال دچار بودن به استفراغ و اسهال ، یا قبل یا بعد از جراحی بزرگ)

سنین کمتر از ۱۸ سال

سایر احتیاطات لازم:

• مصرف بیش از حد قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین (به معنای بیش از ۱۰ روز در ماه) همزمان با سردردهای مزمن (۱۵ روز یا بیشتر در ماه) ، برای بیش از ۳ ماه ، می تواند سردرد را میگرن شما را بدتر کند.

• مصرف قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین ممکن است علائم عفونت (مثل سردرد و تب) را کاهش دهد و بنابراین ممکن است تشخیص آن را دشوارتر کند. اگر احساس ناراحتی می کنید و نیاز به مراجعه به پزشک دارید، به یاد داشته باشید که پزشک خود را از مصرف این قرص مطلع کنید.

• قرص استامینوفن/ کافئین / آسپیرین ممکن است بر نتایج آزمایشات بالینی تأثیر بگذارد. در صورت انجام آزمایشات خون ، ادرار یا سایر آزمایش ها، در خصوص مصرف این قرص به پزشک اطلاع دهید.

• مصرف داروها، غذاهای یا نوشیدنی های حاوی کافئین را هنگام مصرف این دارو محدود کنید، زیرا کافئین زیاد ممکن است باعث عصبی شدن، تحریک پذیری، بی خوابی و حتی افزایش ضربان قلب شود.

• رانندگی و استفاده از ماشین آلات:

شواهدی مبنی بر اثرگذاری مصرف قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین بر توانایی رانندگی و استفاده از ماشین آلات، وجود ندارد، با این حال در صورت مواجهه با عوارضی مانند سرگیجه یا خواب آلودگی شدید، از رانندگی، کار یا ماشین آلات و انجام کارهایی که نیاز به دقت و تمرکز دارند، خودداری کنید.

تداخلات دارویی:

اگر داروی دیگری مصرف می کنید، یا اخیراً داروی دیگری مصرف کرده اید (که شامل داروهای بدون نسخه هم می شود)، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. ممکن است لازم باشد پزشک دارو یا دوز

مصرفی آن را تغییر دهد. این امر در رابطه با داروهای زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

- سایر ترکیبات دارویی حاوی استامینوفن ، آسپیرین و یا هرگونه داروی ضد درد و تب
- داروهای ضد تجمع پلاکت و ضد انعقاد (مانند وارفارین، آپیکسان،دابیکاتون، هپارین، استروکیناز، آلتیلاز، رتپلاز، تیکلویدین، گلوئیدوگرل، سیلوستازول، دی پیریدامول، تیکاگورلور، تیکلویدین و تیروفیبان)
- کورتیکواستروئیدها (مانند بتامتازون، دکازمتازون، پردنیزولون، متیل پردنیزولون)
- مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین (مانند سیتالوپرام، اس سیتالوپرام ، فلوکستین، فلووکسامین، دولوکستین، پاروکستین)
- برخی آنتی بیوتیک ها (مانند ریفاپیمسین، ایزونیازید، کلرامنیکل، سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و افلوکساسین)
- داروهای ضد صرع (مثل استازولامید، والپروات سدیم، دیوالپروکس، فنی توئین، فوس فنی توئین)
- داروهای ضد فشار خون و نارسایی قلبی (مثل آتالاپرل، آلیسکیرن، فوروزامید، هیدروکلروتیازید، اسپیرونولاکتون، آمپلوراید، آملودیپین، آنتولول، بتاکسولول، کارودیلول، دلتیازم، لوزارتان، متوپرولول، تنوفیلین، تربینافین، سایمتیدین، دی سولفیرام، نیکوتین، کلستیرامین، کلوزاپین، زیدودوین، لووتیروکسین، متوکلوپرامید، متوتروکسات، لیتیم، سیکلوسپورین ، بنتوکسی فیلین، تاکرولیموس، دفرایروکس، پروپنسید، پروپانتلین، گلیپروراید و انسولین.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

همیشه دارو را دقیقاً به نحوی که پزشک برایتان تجویز کرده است استفاده کنید. این کار به افزایش اثربخشی و کاهش عوارض جانبی دارو برای شما کمک می کند.

استفاده طولانی مدت و بیش از دوز اعلام شده (مگر تحت نظارت پزشک) ممکن است مضر باشد. از کمترین دوز موثر ممکن جهت درمان علائم خود استفاده کنید.

بالغین (بالای ۱۸ سال)

همزمان با شروع سردرد، علائم میگرن یا اورا، ۲-۱ قرص را به همراه یک لیوان آب مصرف کنید. در صورت نیاز می توانید دوز مصرفی را هر ۴ تا ۶ ساعت تکرار کنید.

بیش از ۱۰ قرص در طول ۲۴ ساعت استفاده نکنید.

بدون مشورت با پزشک از قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین بیش از ۴ روز متوالی برای درمان سردرد استفاده نکنید.

کودکان و نوجوانان

از مصرف قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال خودداری کنید.

مصرف بیش از مقدار توصیه شده

در صورت مصرف تعداد قرص بیش از مقدار توصیه شده، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید. دریافت سریع مراقبت های پزشکی لازم، به دلیل خطر احتمالی آسیب کبدی برگشت ناپذیر ناشی از مسمومیت با استامینوفن، ضروری است. منتظر بروز علائم مسمومیت نباشید، زیرا علائم مصرف بیش از اندازه این دارو ممکن است با تاخیر بروز کنند.

عوارض جانبی:

مانند همه داروها، قرص استامینوفن/ کافئین/ آسپیرین می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، هرچند که در همه افراد به طور یکسان بروز نمی یابند. عوارضی که ممکن است با مصرف این قرص بروز کند:

عوارض شایع:

عصبی بودن، گیجی، حالت تهوع، ناراحتی شکمی

عوارض غیر شایع:

بی خوابی، لرز، بی حسی، سردرد، خستگی دهان، اسهال، استفراغ، خستگی، افزایش ضربان قلب

عوارض نادر:

گلو درد، مشکل در بلع، بی حسی یا گزگز اطراف دهان، براق زیاد، کاهش اشتها، تغییر در چشایی، اضطراب، سرخوشی، اختلال توجه، از دست دادن حافظه، احساس درد در گونه ها و پیشانی، درد چشم، اختلال بینایی، گرگرفتگی، خونریزی بینی، تنفس کند ، آبریزش بینی، نفخ شکم، خارش، بثورات خارش دار، افزایش حساسیت پوست، سفتی عضلات، استفراغ ها یا مفاصل،گردن درد، کمر درد، اسهال، عضلات، ضعف، ناراحتی قفسه سینه
برخی از عوارض ایجاد شده ممکن است جدی و مهم بوده و نیاز به اقدامات پزشکی فوری داشته باشند. گرچه احتمال بروز این عوارض اندک است، ولی در صورت مواجهه با هر یک از آن ها سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید. این عوارض عبارتند از:

- عارضه ی واکنش حساسیتی با علائم بثورات جلدی، خارش، تورم صورت، لب یا زبان، اختلال در تنفس، کاهش شدید فشار خون، ضعف و احساس سبکی سر
- خونریزی یا زخم در معده یا روده، که ممکن است با علائم درد شدید معده، مدفوع خونی یا سیاه یا استفراغ خونی همراه باشد.
- زردی پوست یا چشم ها، سبکی سر یا گیجی، ضربان قلب نامنظم
- کبودی یا خونریزی بدون دلیل یا افزایش دفعات خونریزی بینی
- تورم یا احتباس آب، صدای زنگ در گوش یا کاهش موقت شنوایی، تغییر در رفتار ، حالت تهوع و استفراغ

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان

تهران-ایران

ابوریحان

شرکت داروسازی



Aburayhan
Pharmaceutical Co.

A.C.A

Acetaminophen 162.5mg /Caffeine 32.5mg /Aspirin 325mg
Two-layer Tablet



Drug description:

Acetaminophen/Caffeine/Aspirin is available as two-layer Tablet. Each tablet contains 325mg acetylsalicylic acid (aspirin), 162.5mg paracetamol and 32.5mg caffeine, for oral use.

Category:

Analgesic

Indications:

It is used for the acute treatment of headache and migraine attacks with or without aura.

Contraindication:

You should NOT be given Acetaminophen/Caffeine/Aspirin tablet if you:

- Are allergic to aspirin, acetaminophen, caffeine or any other ingredients of this medicine
- Have ever had an allergic reaction to other medicines used to treat pain, inflammation or fever, such as salicylates, or any other anti-inflammatory medicines known as NSAIDs such as diclofenac or ibuprofen
- Have a stomach or intestinal ulcer, or if you have a history of peptic ulceration
- Have noticed blood in your stools or black stools
- Are a hemophiliac or suffering from other blood disorders
- Have severe heart, liver and kidney problems
- Take more than 15 mg methotrexate per week
- Are in the last 3 months of pregnancy
- Are pediatric patient less than 18 years old who have or who are recovering from chickenpox or flu.

Pregnancy/Breast feeding:

Tell your doctor or pharmacist if you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, before taking this medicine.

Pregnancy

This medicine is not recommended during pregnancy, especially during the last 3 months of pregnancy, as it could harm your unborn child or cause problems at delivery.

Breast feeding

Do not take Acetaminophen/Caffeine/Aspirin tablet if you are breast-feeding as it might be harmful for your infant.

Warning and Precaution:

Talk to your doctor or pharmacist before taking Acetaminophen/Caffeine/Aspirin tablet if you:

- Have not been diagnosed with migraine before, as potentially serious conditions relating to the brain or nerves need to be excluded before treatment
- Have A headache different from your usual migraines, or if you have vomiting with your migraine headache
- Start having headaches after or caused by head injury, exertion, coughing or bending
- Have chronic headaches (15 days or more per month for more than 3 months), or if you experience your first headache after the age of 50
- Have liver or kidney problems or a severe infection
- Are severely malnourished, are severely underweight, or are a chronic heavy alcohol user, as this may increase the risk of metabolic acidosis
- Suffer from a hereditary condition called glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency
- Have ever had gastrointestinal problems such as stomach ulcer, bleeding or black stools. If you have had stomach discomfort or heartburn after taking pain relievers or anti-inflammatory medicines in the past
- Suffer from bleeding disorders or abnormal vaginal bleeding other than your menstrual period (e.g., unusually heavy and prolonged menstrual period)
- Have recently undergone a surgical operation (including minor ones such dental surgery) or will undergo one within the next 7 days
- Have bronchial asthma, hay fever, nasal polyps, a chronic respiratory disease or develop allergic symptoms
- Have gout, diabetes, hyperthyroidism, arrhythmia, uncontrolled hypertension
- Are already taking other medicinal products containing acetylsalicylic acid (aspirin) or acetaminophen
- Are at risk of being dehydrated (e.g., by vomiting, diarrhea, or before or after major surgery)
- Are less than 18 years of age

Other precautions

- Taking Acetaminophen/Caffeine/Aspirin too often (meaning on more than 10 days per month for this product) with concurrent chronic headaches (15 days or more per month), for more than 3 months, could worsen your headache or migraine.
- Acetaminophen/Caffeine/Aspirin may reduce the symptoms of an infection (e.g., headache, high temperature) and may therefore make it more difficult to detect. If you feel unwell and need to see a doctor, remember to tell him or her that you are taking this tablet.
- Acetaminophen/Caffeine/Aspirin may affect the results of laboratory tests. If you have been asked to have blood, urine or other laboratory testing, remember to tell that you are taking this tablet.
- Limit your intake of caffeine containing medications, foods, or beverages while taking this medicine because too much caffeine may cause nervousness, irritability, sleeplessness, and occasionally, rapid heartbeat.

Driving and using machines

Taking Acetaminophen/Caffeine/Aspirin is not known to affect your ability to drive and use machines. If you notice side effects such as dizziness or drowsiness, you should not drive or use machines. Tell your doctor as soon as possible.

Drug Interaction:

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription. Your doctor may need to change your dose and/or to take other precautions. In some cases, you may have to stop taking one of the medicines. This applies especially to the medicines listed below:

- Any other medicinal product that contains acetaminophen, aspirin or any other pain reliever/ fever reducer
- Oral anticoagulants (e.g., warfarin, apixaban, dabigatran), heparin, thrombolytics (e.g., streptokinase, alteplase, reteplase), or other antiplatelets (e.g., ticlopidine, clopidogrel, cilostazol, dipyridamole, ticagrelor, ticlopidine, tirofiban)
- Corticosteroids (e.g., betamethasone, dexamethasone, methylprednisolone, prednisolone)
- Selective serotonin reuptake inhibitors (e.g., citalopram, escitalopram, fluoxetine), fluvoxamine, duloxetine, paroxetine,
- Some antibiotics (e.g., rifampicin, isoniazid, chloramphenicol, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin).
- Epilepsy medication (e.g., acetazolamide, valproate sodium, divalproex, fosphenytoin, phenytoin)
- High blood pressure and heart failure medication (e.g., amiloride, hydrochlorothiazide, amlodipine, aliskiren, atenolol, betaxolol, carvedilol, diltiazem, enalapril, furosemide, losartan, metoprolol, nimodipine, spironolactone)
- Theophylline, terbinafine, cimetidine, disulfiram, nicotine, cholestyramine, clozapine, zidovudine, levothyroxine, metoclopramide, methotrexate, lithium, cyclosporine, pemetrexed, pentoxifylline, tacrolimus, deferasirox, probenecid, propantheline, glyburide and insulin.

Dosage and Administrations:

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor if you are not sure. This will help you get the best results and lower the risk of side effects.

Prolonged use except under medical supervision may be harmful. Do not take more than the stated dose. Use the smallest dose that you need to treat your symptoms and use this medicine for the shortest period of time necessary

Adults (18 years of age and older):

Take 1-2 tablet with a full glass of water when headache pain, migraine symptoms or migraine aura appears. If needed, you can take another 1-2 tablet every 4 to 6 hours. Do not exceed 10 tablets over a period of 24 hours.

Do not use Acetaminophen/Caffeine/Aspirin tablet for more than 4 days without consulting your doctor.

Children and adolescents:

Acetaminophen/Caffeine/Aspirin should not be given to children and adolescents under the age of 18.

If you take more Acetaminophen/Caffeine/Aspirin than you should

Contact your doctor, pharmacist or go to the nearest hospital as soon as you think you might have taken an overdose. Immediate medical attention is critical, because of the potential risk of irreversible liver damage due to acetaminophen. Do not wait for symptoms to appear as the overdose might not, at first, produce any noticeable symptoms.

Side effects:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. It may cause:

Common: nervousness, dizziness, nausea, abdominal discomfort

Uncommon: insomnia, trembling, numbness, headache, dry mouth, diarrhea, vomiting, fatigue, heart rate increased

Rare: sore throat, difficulty in swallowing, numbness or tingling around the mouth, too much saliva, decreased appetite, altered taste, anxiety, euphoric mood, disturbance in attention, memory loss, feeling of pain in the cheeks and forehead, eye pain, vision disorder, hot flushes, nose bleeds, slow and shallow breathing, runny nose, flatulence, itching, itchy rash, increased skin sensitivity, stiffness in muscles, bones or joints; neck pain, back pain, muscles spasms, weakness, chest discomfort

Stop taking Acetaminophen/Caffeine/Aspirin and tell your doctor immediately if you have any of these serious side effects:

- Allergic reaction with swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat. You may also have a skin rash, reddening or itching and experience fainting
- Bleeding in the stomach or intestine, ulcer in stomach or intestine, which may be accompanied by severe stomach pain, bloody or black stools, or vomiting blood
- Yellowing of the skin or eyes, light-headedness or dizziness, irregular heartbeat
- Unexplained bruising or bleeding or increase in the number of nosebleeds
- Swelling or water retention, ringing in your ears or temporary hearing loss, changes in behavior, nausea and vomiting

Storage:

Store below 30°C, protect from light and moisture.

Keep out of reach of children.



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

Manufactured by **Aburaihan** Pharma.Co.
Tehran-Iran



Aburaihan
Pharmaceutical Co.