

پماد جلدی کلوبتازول ۰.۵٪



مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی یک عدد تیوب ۱۵ گرمی پماد کلوبتازول پروپیونات می باشد که هر ۱۰۰ گرم پماد، حاوی ۰.۵ گرم کلوبتازول پروپیونات می باشد.

موارد مصرف:

کلوبتازول یک داروی ضد التهاب از دسته کورتیکواستروئیدها است که در کاهش التهاب بیماری های نظیر درماتیت تماسی، اگزما، آفتاب سوختگی، پسوریازیس که به درمان های ضعیف تر کورتیکواستروئیدها پاسخ نمی دهند بکار می رود.

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو و سایر کورتیکواستروئیدها
- در کودکان زیر یک سال
- برای درمان مشکلات پوستی زیر، استفاده از پماد کلوبتازول می تواند وضعیت را بدتر کند و بهتر است استفاده نشود:
- آکنه، سوزش شدید پوست روی بینی و اطراف آن (روزاسه)، بثورات قرمز در اطراف دهان، خارش بخش تناسلی مگر به تجویز پزشک، عفونت های ویروسی مانند تبخال و آبله مرغان، عفونت های قارچی مانند برفک و کرم های انگلی، زخم های عفونی

مصرف در بارداری و شیردهی:

اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید، قبل از استفاده از این دارو، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. استفاده از کلوبتازول در هنگام شیردهی توصیه نمی شود. در دوران شیردهی از استعمال کلوبتازول در ناحیه سینه خودداری نمایید تا از مسمومیت نوزاد اجتناب گردد.

موارد احتیاط و هشدارها:

- این دارو تنها برای مصرف خارجی می باشد، از تماس با چشم خودداری کنید.
- طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از پانسمان خود سرانه ضایعه خودداری کنید (مگر به تشخیص پزشک).
- پانسمان جذب دارو را خصوصاً در کودکان افزایش میدهد.
- در صورتی که تحریکات پوستی و التهاب ناحیه استعمال پماد بهبود نیافت و بدتر شد، استفاده این دارو باید قطع شود. مصرف این پماد در کودکان به دلیل جذب سیستمیک آن ممکن است باعث ضعف شدن هیپوتالاموس، غده فوق کلیوی و هیپوفیز گردد.
- در صورت استفاده این پماد و به دنبال آن ایجاد عفونت، با پزشک معالج خود مشورت کنید. مصرف طولانی مدت داروی کلوبتازول موضعی و استفاده آن روی سطح وسیعی از بدن و پانسمان ناحیه استعمال، جذب سیستمیک این دارو را افزایش می دهد.
- اگر دچار تاری دید یا اختلالات چشمی دیگر از جمله گلوکوم و آب مروارید شدید، به پزشک خود اطلاع دهید.
- استفاده طولانی مدت مداوم یا نامناسب از استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بازگشت علائم پس از قطع درمان شود (سندرم ترک استروئید موضعی). فرم شدیدی از بازگشت علائم که به صورت درماتیت همراه با قرمزی شدید، سوزش و گزگز است، می تواند حتی در نواحی فراتر از نواحی درمان اولیه ایجاد شده و گسترش یابد. زمانی که دارو در نواحی که پوست نازک تر و ظریف تری دارند مانند صورت استفاده می شود، احتمال بروز این مشکل بیشتر است. در صورت بروز مجدد علائم طی چند روز تا چند هفته بعد از درمان موفق، می توانید احتمال وقوع این سندرم را در نظر بگیرید.
- استفاده مجدد از این دارو می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص، پس از بررسی امکان استفاده از درمان های جایگزین انجام شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- * یک لایه نازک از پماد کلوبتازول را ۱ یا ۲ بار در روز استفاده کنید. ممکن است در صورت بهبودی، مصرف آن به مرور کاهش یابد یا متوقف شود.
- * برای مدت طولانی (هر روز برای چندین هفته یا چندین ماه) در مناطق وسیع بدن استفاده نکنید. اگر به مدت طولانی به درمان نیاز دارید، پزشک ممکن است تصمیم بگیرد که از کرم یا پماد ملایم تری استفاده کنید.
- * در شرایط پانسمان پوست، به دلیل گرما و رطوبت، احتمال عفونت بیشتر است، بنابر این پوست را قبل از اینکه پانسمان کنید تمیز کنید.
- * اگر مشکل پوستی شما در طی ۲ تا ۴ هفته بهبود نیابد، به پزشک خود مراجعه نمایید.

عوارض جانبی:

این دارو نیز مانند سایر داروها، می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه در همه افراد مشاهده نمی شود. احساس سوزش، تحریک یا خارش، تاری دید، نازک شدن پوست و مشخص شدن رگ های زیر پوست، افزایش رشد مو و تغییرات در رنگ پوست، افزایش وزن، گرد شدن صورت، افزایش فشارخون، سرورتنوپاتی مرکزی و تاری دید اگر هر کدام از عوارض جانبی ذکر شده، شدت یابند یا بیش از چند روز طول بکشند، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ایوریحان
شرکت داروسازی
تهران-ایران



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

CLOBETASOL 0.05% Ointment



Description:

Each box contains a 15 g Clobetasol propionate ointment, which contains 0.05 g of Clobetasol propionate per 100 gr ointment.

Indication:

Clobetasol belongs to a group of medicines called steroids. It helps to reduce swelling and irritation. Clobetasol is used to help reduce the redness and itchiness of certain skin problems.

These skin problems include eczema, psoriasis and dermatitis that have not responded to milder steroid creams or ointments.

Contraindication:

- If you are allergic to clobetasol propionate or any of the other ingredients of this product.
- On a child under 1 year old
- To treat any of the following skin problems, it could make them worse:

- Acne
- Severe flushing of skin on and around your nose (rosacea)
- Spotty red rash around your mouth (perioral dermatitis)
- Itching around your back passage or private parts - unless your doctor has told you to do so
- Viral infections, such as cold sores, herpes or chicken pox
- Fungal infections, such as ringworm, athlete's foot or thrush
- Skin blisters or sores that are caused by an infection.

Pregnancy and breast feeding:

If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor or pharmacist for advice before using this medicine.

The use of clobetasol is not recommended during breast-feeding. If you use clobetasol when breast-feeding, do not use it on your breast area to ensure that the baby does not accidentally get clobetasol in their mouth.

Warning and precautions:

- This medication is to be used as directed by the physician. It is for external use only.
- Avoid contact with the eyes.
- Talk to your doctor, pharmacist before using clobetasol if you are applying the ointment under an airtight dressing, including a child's nappy. These dressings make it easier for the active ingredient to pass through the skin.
- The treated skin area should not be bandaged, otherwise covered, or wrapped so as to be occlusive unless directed by the physician.
- Contact your doctor if you experience blurred vision or other visual disturbances.
- Patients should report any signs of local adverse reactions to the physician.
- Clucoma and cataracts are associated with corticosteroid use.
- Long term continuous or inappropriate use of topical steroids can result in the development of rebound flares after stopping treatment (topical steroid withdrawal syndrome). A severe form of rebound flare can develop which takes the form of a dermatitis with intense redness, stinging and burning that can spread beyond the initial treatment area. It is more likely to occur when delicate skin sites such as the face and flexures are treated. Should there be a reoccurrence of the condition within days to weeks after successful treatment a withdrawal reaction should be suspected. Reapplication should be with caution and specialist advice is recommended in these cases or other treatment options should be considered.

Administration & Usage:

You usually apply a thin layer of clobetasol propionate 1 or 2 times a day. This may be reduced as your skin begins to get better, or stopped when it is better.

- This ointment is for use on your skin only.
 - Do not use on large areas of the body for a long time (such as every day for many weeks or months).
- If you need treatment for a long time, your doctor may decide you need to use a milder cream or ointment.
- The germs that cause infections like warm and moist conditions under dressings so always clean the skin before a fresh dressing is put on.
 - If you are applying the ointment on someone else make sure you wash your hands after use or wear disposable plastic gloves.
 - If your skin problem does not improve in 2 to 4 weeks, reassessment of the diagnosis, or referral, may be necessary.

Side Effects:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

A feeling of burning, irritation or itching, blurred vision, stretch marks may develop, veins under the surface of your skin may become more noticeable, increased hair growth and changes in skin colour, thinning of your skin that may also damage more easily, weight gain, rounding of the face and high blood pressure. These are more likely to happen in children blurred vision and central serous retinopathy can occur.

If any of the above side effects are troublesome or last more than a few days, please inform your doctor or pharmacist.

Storage:

Store below 30°C and protect from freezing.
Keep out of reach of children



Aburaihan
Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran



Aburaihan
Pharmaceutical Co.